



Katta

Lemur catta
Ring-tailed lemur

Bedrohung: "gering gefährdet" (IUCN)

Verbreitung

Der Katta ist im Süden der Insel Madagaskar beheimatet.

Lebensraum

Kattas leben in Trocken- und Dornenwäldern sowie im Gebirge bis auf über 2000 Meter Höhe.

Ernährung

Als Nahrung dienen ihnen hauptsächlich Blätter und Früchte aber auch Insekten.

Fortpflanzung

Die Paarung erfolgt bei den Kattas in der Regenzeit zwischen April und Juni. Nach einer Tragzeit von ca. 130 bis 140 Tagen werden meist ein oder zwei Jungtiere geboren. An der Aufzucht beteiligen sich neben der Mutter auch andere Gruppenmitglieder. Nach ca. 10 Wochen werden die Jungen allmählich entwöhnt.



Kattas sind wahre Sonnenanbeter. Besonders in den frühen Morgenstunden sitzen sie gern mit ausgebreiteten Armen hoch oben in den Bäumen.



Lebensweise

Kattas sind tagaktiv. Da ihr Lebensraum kein geschlossenes Kronendach aufweist, sind sie gut an die bodennahe Lebensweise angepasst. Sie leben in Gruppen von zehn oder mehr Tieren, wobei in der Rangordnung die Weibchen den Männchen immer überlegen sind. Besonders zur Paarungszeit führen die Männchen "Stinkkämpfe" durch. Sie bestreichen ihren Schwanz mit Sekreten aus den Armdrüsen und schwenken ihn in Richtung des Rivalen. Wer am meisten stinkt, gewinnt.

Summary

Ring-tailed Lemurs live in groups of 10 or more individuals in the dry open areas and forest in Southern Madagascar. They mostly feed on leaves and fruits, but occasionally also on insects. In Lemur society, the females are in charge. Ring-tailed Lemurs like to sun-bath early in the morning.



Roter Vari

Varecia variegata rubra
Red ruffed lemur

Bedrohung: "vom Aussterben bedroht" (IUCN)

Verbreitung

Die Heimat des Roten Varis ist die Masoala Halbinsel im Nordosten Madagaskars.

Lebensraum

Varis leben in tropischen Regenwäldern, vorwiegend in den oberen Baumregionen in 20 bis 25 m Höhe.

Ernährung

Die Nahrung der Varis besteht hauptsächlich aus Blättern und Früchten.

Fortpflanzung

Die Paarung der Varis erfolgt zwischen Juni und Juli. Nach rund 100 Tagen werden meist Zwillinge geboren. Diese verbringen die ersten zwei Wochen zumeist in Nestern hoch oben in den Bäumen. Nach vier bis fünf Monaten werden die Jungen allmählich entwöhnt.



Varis sind im Freiland nicht nur durch die Zerstörung ihres Lebensraumes bedroht. Als größte Gattung innerhalb der Familie der Lemuren sind sie auch als Speise bei den Einheimischen sehr beliebt.



Lebensweise

Varis sind hauptsächlich in den frühen Morgenstunden sowie am Abend aktiv. Sie leben in Familien- und Kleingruppen wobei sich je nach Jahreszeit auch mehrere Gruppen zusammenschließen können. Durch lautstarkes Rufen bleiben die einzelnen Gruppenmitglieder in Kontakt, verständigen sich über eventuelle Gefahren und teilen anderen Gruppen ihre Revieransprüche mit.

Summary

Red ruffed lemurs live in family groups consisting of 2 adults and their cubs in rainforests in the North-east of Madagascar. For breeding Ruffed lemurs build nests high up in the trees. They mostly feed on leaves and fruits. They keep in contact with each other using loud calls.