



9. Anhang


9.1 Biototypenkarten


9.1.1 Biototypenkarte mit Übersicht der Detailkarten








9.1.3 Biotoptypenkarte Blatt 2 (Südlich Wustrow)
































9.2 Gesamtartenliste

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen	
	L	T	F	R	N				MV	D	§/C		
Aktuelle Funde													
Acer negundo LINNAEUS 1753	(5)	6	6	7?	7	P	K						Eschen-Ahorn
Acer platanoides LINNAEUS 1753	(4)	6	x	x	x	P	W						Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus LINNAEUS 1753	(4)	x	6	x	7	P	W						Berg-Ahorn
Achillea millefolium LINNAEUS 1753	9	6	4	7	2	H	G, M	x					Gew. Schafgarbe
Acorus calamus LINNAEUS 1753	8	6	10	7	7	A	G						Kalmus
Aegopodium podagraria LINNAEUS 1753	5	5	6	7	8	H, G	R	x					Gew. Giersch
Aesculus hippocastanum LINNAEUS 1753	5	6	?	?	?	P	K						Gew. Rosskastanie
Agrimonia eupatoria LINNAEUS 1753	7	6	4	8	4	H	A	x					Kleiner Odemennig
Agrostis capillaris LINNAEUS 1753	7	x	x	x	4	H	M	x					Rotes Straußgras
Agrostis stolonifera LINNAEUS 1753	8	x	7~	x	5	H	B	x					Weißes Straußgras
Aluga genevensis LINNAEUS 1753	8	x	3	7	2	H	A	x	3	V			Heide-Günsel
Alliaria petiolata (MARSHALL VON BIEBERSTEIN) CAVARA et GRANDE 1913	5	6	5	7	9	H, C	W						Knoblauchstrauke
Allium sativum LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	G	K	x					Knoblauch
Alnus glutinosa (LINNAEUS) GAERTNER 1790	(5)	5	9=	6	x	P	C	x					Schwarz-Erle
Alopecurus pratensis LINNAEUS 1753	6	x	6	6	7	H, G	F	x					Wiesen-Fuchsschwanz
Anagallis arvensis LINNAEUS 1753	6	6	5	x	6	T	S		V				Acker-Gauchheil
Anchusa arvensis (LINNAEUS) MARSHALL VON BIEBERSTEIN 1808	9	7	3	7	5	H	S	x					Acker-Krummhals
Anchusa officinalis LINNAEUS 1753	9	7	3	7	5	H	D, A	x					Gew. Ochsenzunge
Anemone ranunculoides LINNAEUS 1753	3	6	6	8	8	G	W	x					Gelbes Windröschen
Angelica sylvestris LINNAEUS 1753	7	x	8	x	4?	H	F	x	V				Wald-Engelwurz
Anthriscus sylvestris (LINNAEUS) HOFFMANN 1814	7	x	5	x	8	H	R	x					Wiesen-Kerbel
Apera spica-venti (LINNAEUS) PAUSOT DE BEAUVOIS 1812	6	6	6	5	x	T	S	x					Gew. Windhalm
Aphanes arvensis LINNAEUS 1753	6	6	6	x	5	T	S	x					Gew. Ackerfrauenmantel
Arabiopsis thaliana (LINNAEUS) HEYNHOLD 1842	8	6	4	x	6	T	M						Acker-Schmalwand
Arctium lappa LINNAEUS 1753	9	6	5	7	9	H	R	x					Große-Klette
Arctium minus (HILL) BERNHARDI 1800	9	5	5	x	8	H	R	x					Kleine Klette
Armeria maritima ssp. elongata (HOFFMANN) BONNIER 1927	7	6	3	5?	2?	H, C	M	x	3 II	3	§		Gew. Grasnelke
Arrhenatherum elatius (LINNAEUS) J. PRESL et C. PRESL 1819	8	5	x	7	7	H	B	x					Gew. Glatthafer
Artemisia absinthium LINNAEUS 1753	9	6	4	7	8	H	A	x					Wermut
Artemisia campestris LINNAEUS 1753	9	6	2	5	2	C	A	x					Feld-Beifuß
Artemisia vulgaris LINNAEUS 1753	7	6	6	x	8	H, C	R	x					Gew. Beifuß
Astragalus glycyphyllos LINNAEUS 1753	6	6	4	7	3	H	D						Bärenschote
Avena sativa LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	T	K						Saat-Hafer
Bellis perennis LINNAEUS 1753	8	x	5	x	6	H	K	x					Ausdauerndes Gänseblümchen
Berberis incana (LINNAEUS) DE CANDOLLE 1821	9	6	3	6	4	T, H	M						Graukresse
Berula erecta (HUDSON) COVILLE 1893	8	6	10	8	6	A	G	x					Berle
Betula pendula ROTH 1788	(7)	x	x	x	x	P	W	x					Gew. Birke
Bistorta officinalis DELARBRE 1837	7	4	7	5	5	H, G	F		2				Schlangen-Wiesenknöterich
Brassica napus ssp. napus LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	C	S	x					Raps
Briza media LINNAEUS 1753	8	x	x	x	2	H	A	x	3	V			Gew. Zittergras
Bromus hordeaceus LINNAEUS 1753	7	6	x~	x	3	T	B	x					Weiche Trespe
Bromus inermis LEYSER 1761	8	x	4~	8	5	H	R						Wehrlose Trespe

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	§/C	
<i>Bromus sterilis</i> LINNAEUS 1753	7	6	4	x	5	T	S	x				Taube Trespe
<i>Calamagrostis canescens</i> (WEBER) ROTH 1789	6	6	9=	6	5	H, G	F	x				Sumpfr-Reitgras
<i>Calamagrostis epigejos</i> (LINNAEUS) ROTH 1788	7	5	x~	x	6	G, H	R	x				Land-Reitgras
<i>Calamagrostis stricta</i> (TIMM) KOELER 1802	9	5 ?	9	x	2	H	F	x	3	3		Moor-Reitgras
<i>Caltha palustris</i> LINNAEUS 1753	7	x	9=	x	6?	H, A	F	x				Sumpfr-Dotterblume
<i>Calystegia sepium</i> (LINNAEUS) BROWN 1810	8	6	6	7	9	G	F	x				Gew. Zaunwinde
<i>Campanula patula</i> LINNAEUS 1753	8	6	5	7	5	H	A, G	x	V			Wiesen-Glockenblume
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (LINNAEUS) MEDIKUS 1792	7	x	5?	x	6	T	B	x				Gew. Hirtentäschel
<i>Cardamine amara</i> LINNAEUS 1753	7	x	9=	6?	4	H	C	x				Bitteres Schaumkraut
<i>Cardamine pratensis</i> LINNAEUS 1753	4	x	6	x	x	H	F					Wiesen-Schaumkraut
<i>Carduus crispus</i> LINNAEUS 1753	7	6	6	7	9	H	R	x				Krause Distel
<i>Carex acuta</i> LINNAEUS 1753	7	5	9=	6	4	H, A	F	x				Schlanke Segge
<i>Carex acutiformis</i> EHRHART 1789	7	x	9~	7	5	H	F, C	x				Sumpfr-Segge
<i>Carex appropinquata</i> SCHUMACHER 1801	8	5	9=	9	4	H, A	F	x	2	2		Schwarzschof-Segge
<i>Carex caryophylla</i> LATOURR 1785	8	x	4	x	2	G, H	M	x	3	V		Fühlings-Segge
<i>Carex disticha</i> HUDSON 1762	8	6	9=	8	5	H, G, A	F	x	V			Zweizeilige Segge
<i>Carex elata</i> ALLIONI 1785	8	x	10~	x	5	H, A	F, C	x				Steife Segge
<i>Carex flacca</i> SCHREBER 1771	7	x	6~	8	4	G	F, A	x	3			Blaugrüne Segge
<i>Carex hirta</i> LINNAEUS 1753	7	6	6~	x	5	G	B	x				Behaarte Segge
<i>Carex lepidocarpa</i> TAUSCH 1834	9	5 ?	9	9	2	H	F	x	2			Schuppentüchtige Gelb-Segge
<i>Carex nigra</i> (LINNAEUS) REICHARD 1778	8	x	8~	3	2	H, G	F	x	3			Wiesen-Segge
<i>Carex otrubae</i> PODPERA 1922	6	6	8	7	6	H, A	F		V			Falsche Fuchs-Segge
<i>Carex panicea</i> LINNAEUS 1753	8	x	8~	x	4	H, G	F	x	3	V		Hirse-Segge
<i>Carex paniculata</i> LINNAEUS 1755	7	x	9	6?	5	H, A	F	x		V		Rispen-Segge
<i>Carex remota</i> LINNAEUS 1754	3	5	8	x	x	H	C					Winkel-Segge
<i>Carex riparia</i> CURTIS 1783	7	6	9=	7	4	H, A	F, C	x		V		Ufer-Segge
<i>Carpinus betulus</i> LINNAEUS 1753	(4)	6	x	x	x	P	W					Hainbuche
<i>Centaurea scabiosa</i> LINNAEUS 1753	7	x	3	8	4	H	A	x				Skabiosen-Flockenblume
<i>Cerastium holosteoides</i> FRIES 1817	6	x	5	x	5	C	B	x				Gew. Hornkraut
<i>Cerastium semidecandrum</i> LINNAEUS 1753	8	6	3	6	x	T, H	M	x				Sand-Hornkraut
<i>Cheilonium majus</i> LINNAEUS 1753	6	6	5	x	8	H	W					Schöllkraut
<i>Chenopodium album</i> LINNAEUS 1753	x	x	4	x	7	T	S	x				Weißer Gänsefuß
<i>Chondrilla juncea</i> LINNAEUS 1753	8	7	3	6	x	H	M	x				Großer Knorpellattich
<i>Cichorium intybus</i> LINNAEUS 1753	9	6	4	8	5	H	D	x				Gew. Wegwarte
<i>Cirsium arvense</i> (LINNAEUS) SCOPOLI 1772	8	5	x	x	7	G	R	x				Acker-Kratzdistel
<i>Cirsium oleraceum</i> (LINNAEUS) SCOPOLI 1769	6	x	7	7	5	H	F	x				Kohl-Kratzdistel
<i>Cirsium palustre</i> (LINNAEUS) SCOPOLI 1772	7	5	8	4	3	H	F	x				Sumpfr-Kratzdistel
<i>Cirsium vulgare</i> (SAV) TENORE 1836	8	5	5	7	8	H	R	x				Lanzett-Kratzdistel
<i>Convolvulus arvensis</i> LINNAEUS 1753	7	6	4	7	x	G, H, II	S	x				Acker-Winde
<i>Conyza canadensis</i> (LINNAEUS) CRONQUIST 1943	8	6	4	x	5	T	B	x				Kanadisches Berufkraut
<i>Cornus sanguinea</i> LINNAEUS 1753	7	5	5?	7	x	C	W	x				Blutroter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i> LINNAEUS 1753	6	5	x	x	5?	C	W					Gew. Hasel
<i>Crategea monogyne</i> JACQUIN 1775	7	5	4	8	4	P	T	x				Eingriffeliger Weißdorn
<i>Crepis capillaris</i> (LINNAEUS) WALLROTH 1840	7	6	5	6	4	H	B	x				Kleinköpfiger Pippau
<i>Crepis paludosa</i> (LINNAEUS) MOENCH 1794	7	x	8~	8	6	H	F	x				Sumpfr-Pippau
<i>Cyanus segetum</i> HILL 1769	7	6	x	x	x	T	S	x				Kornflockenblume
<i>Cynoglossum officinale</i> LINNAEUS 1753	8	6	4	7	7	H, T	D	x				Echte Hundszunge

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	§/C	
<i>Cynosurus cristatus</i> LINNAEUS 1753	8	5	5	x	4	H	B	x	3			Weide-Kammgras
<i>Cyperus fuscus</i> LINNAEUS 1753	9	6	7=	x	4	T	F		2			Braunes Zypergras
<i>Dactylis glomerata</i> LINNAEUS 1753	7	x	5	x	6	H	B	x				Gew. Kränkelgras
<i>Dactylocteniza incarnata</i> (LINNAEUS) SOO 1962	8	5	8~	7	2	G	F	x	2 iii	2	§/C	Stiefblättrige Fingerwurz
<i>Daucus carota</i> ssp. <i>carota</i> LINNAEUS 1753	8	6	4	x	4	H	B	x				Wilde Möhre
<i>Deschampsia cespitosa</i> (LINNAEUS) PAISLOT DE BEAUVIS 1812	6	x	7~	x	3	H	F	x				Rasen-Schmieie
<i>Deschampsia flexuosa</i> (LINNAEUS) TRINIUS 1836	6	x	x	2	3	H	W	x				Draht-Schmieie
<i>Descurainia sophia</i> (LINNAEUS) PRANT 1891	8	6	4	x	6	T	R	x				Gew. Besenrauke
<i>Draba verna</i> LINNAEUS 1753	8	6	x	x	2	T	M	x				Frühlings-Hungerblümchen
<i>Dryopteris filix-mas</i> (LINNAEUS) SCHOTT 1834	3	x	5	5	6	H	W					Gew. Wurmfar
<i>Echium vulgare</i> LINNAEUS 1753	9	6	4	8	4	H	M	x				Gew. Natternkopf
<i>Eleocharis uniglumis</i> (LINK) SCHULTES 1824	7	5	10= =	7	5	H, G	F	x	V	V		Einspelzige Sumpfsimse
<i>Elymus repens</i> (LINNAEUS) GOULD 1947	7	6	x~	x	7	G, H	B	x				Gew. Quecke
<i>Epilobium parviflorum</i> SCHERBER 1771	7	5	9=	8	6	H	F	x				Kleinblütiges Weidenröschen
<i>Equisetum arvense</i> LINNAEUS 1753	6	x	x~	x	3	G	B	x				Acker-Schachtelhalm
<i>Equisetum fluviatile</i> LINNAEUS 1753	8	4	10	x	5	G	F	x				Teich-Schachtelhalm
<i>Equisetum palustre</i> LINNAEUS 1753	7	x	8	x	3	G	F	x				Sumpf-Schachtelhalm
<i>Erigeron acris</i> LINNAEUS 1753	9	5	4	8	2	T, H	A	x	V			Scharfes Berufkraut
<i>Erodium cicutarium</i> (LINNAEUS) L'HERTIER DE BRUTELLE 1789	8	6	4	5	4?	T	S					Gew. Reiherschnabel
<i>Euonymus europaeus</i> LINNAEUS 1753	6	5	5	8	5	C	W					Europäisches Pfaffenhütchen
<i>Eupatorium cannabinum</i> LINNAEUS 1753	7	5	7	7	8	H	F	x				Gew. Wasserdost
<i>Euphorbia cyparissias</i> LINNAEUS 1753	8	x	3	x	3	H	S	x				Zypressen-Wolfsmilch
<i>Euphorbia helioscopia</i> LINNAEUS 1753	6	x	5	7	7	T	S					Sonnenwend-Wolfsmilch
<i>Fagus sylvatica</i> LINNAEUS 1753	(3)	5	5	x	x	P	W					Gew. Buche
<i>Falcaria vulgaris</i> BERNHARDI 1800	7	7	3	9	x	H	A	x				Gew. Sichelmöhre
<i>Fallopia convolvulus</i> (LINNAEUS) LOVE 1970	7	6	5	x	6?	T, li	S	x				Acker-Windenknöterich
<i>Fallopia japonica</i> (HOULTUYN) RONE DEGRAENE 1988	8	6	8=	5	7	G	K					Japanischer Staudenknöterich
<i>Festuca arundinacea</i> SCHREBER 1771	8	5	7~	7	5	H	F	x				Rohr-Schwingel
<i>Festuca brevipila</i> TRACEY 1977	8	6	3	x	2	H	M	x				Raubblättriger Schwingel
<i>Festuca gigantea</i> (LINNAEUS) VILLARS 1787	4	5	7	6	6	H	W					Riesen-Schwingel
<i>Festuca ovina</i> LINNAEUS 1753	7	x	x	3	1	H	M	x	3			Schaf-Schwingel
<i>Festuca pratensis</i> HUDSON 1762	8	x	6	x	6	H	B	x				Wiesen-Schwingel
<i>Festuca rubra</i> LINNAEUS 1753	x	x	6	6	x	H	B	x				Rot-Schwingel
<i>Ficaria verna</i> HUDSON 1762	4	5	6	7	7	G	W					Scharbockskraut
<i>Filago arvensis</i> LINNAEUS 1753	9	6	2	4	1	H	S		V	3		Acker-Filzkraut
<i>Filipendula ulmaria</i> (LINNAEUS) MAXIMOWICZ 1879	7	5	8	x	5	H	F	x				Echtes Mädesüß
<i>Fragaria viridis</i> WESTON 1771	7	5	3	8	3	H	T, W	x	3			Krack-Erdbeere
<i>Fumaria officinalis</i> LINNAEUS 1753	6	6	5	6	7	T	S		V			Gew. Erdrauch
<i>Galeobdolon luteum</i> HUDSON 1778	3	5	5	7	5	H	W					Echte Goldnessel
<i>Galeopsis bifida</i> BOENINGHAUSEN 1824	7	5 ?	5	6?	6?	T	B	x				Kleinblütiger Hohlzahn
<i>Galium album</i> MILLER 1768	7	x	5	7	5	H	B	x				Weißes Labkraut
<i>Galium aparine</i> LINNAEUS 1753	7	6	x	6	8	T	R	x				Kletten-Labkraut
<i>Galium odoratum</i> (LINNAEUS) SCOPOLI 1771	2	5	5	6?	5	C, G	W					Waldmeister
<i>Galium palustre</i> LINNAEUS 1753	6	5	9=	x	4	H	F	x				Sumpf-Labkraut
<i>Galium uliginosum</i> LINNAEUS 1753	6	5 ?	8~	x	2?	H	F	x	V			Moor-Labkraut
<i>Geranium molle</i> LINNAEUS 1753	7	6	4	5	4	T	B	x				Weicher Storchschnabel

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	s/c	
<i>Geranium robertianum</i> LINNAEUS 1753	5	x	x	x	7	T	W	x				Sinkende-Storischschnabel
<i>Geum rivale</i> LINNAEUS 1753	6	x	8~	x	4	H	F	x	V			Bach-Nelkenwurz
<i>Geum urbanum</i> LINNAEUS 1753	4	5	5	x	7	H	R	x				Echte Nelkenwurz
<i>Glechoma hederacea</i> LINNAEUS 1753	6	6	6	x	7	G, H	B	x				Gew. Gundermann
<i>Glyceria declinata</i> BREQ 1859	5	6	8~	6?	5?	H, G	F					Blaugrüner Schwaden
<i>Glyceria fluitans</i> (LINNAEUS) BROWN 1810	7	x	9=	x	7	H, A	F	x				Flutender Schwaden
<i>Gnaphalium uliginosum</i> LINNAEUS 1753	7	6	7	4	4	T	F	x				Sumpf-Ruhrkraut
<i>Helichrysium arenarium</i> (LINNAEUS) MOENCH 1794	8	6	2	5	1	H	M	x	V	3	\$	Sand-Strohblume
<i>Helictotrichon pubescens</i> (HUDSON) PILG 1938	5	x	3?	x	4	H, G	B	x	3			Flaumiger Wiesenhafer
<i>Hieracium murorum</i> LINNAEUS 1753	4	x	5	5	4	H	W					Wald-Habichtskraut
<i>Hieracium spec.</i>	-	-	-	-	-	-	-	x				Habichtskraut
<i>Holcus lanatus</i> LINNAEUS 1753	7	6	6	x	5	H	B	x				Wolliges Honiggras
<i>Hordeum vulgare</i> LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	T	S	x				Saat-Gerste
<i>Humulus lupulus</i> LINNAEUS 1753	7	6	8=	6	8	H	W	x				Gew. Hopfen
<i>Hydotelephium maximum</i> (LINNAEUS) HOLUB 1978	8	6	3	5	3	H	D	x				Purpur-Waldfethenue
<i>Hypericum maculatum</i> GRANTZ 1763	8	x	6~	3	2	H	D	x	3			Kantau-Harthau
<i>Hypericum perforatum</i> LINNAEUS 1753	7	6	4	6	4	H	D	x				Tüpfel-Harthau
<i>Hypericum tetraplerum</i> FRIES 1823	7	5	8=	7	5?	H	F	x		V		Flügel-Harthau
<i>Hypochaeris radicata</i> LINNAEUS 1753	8	5	5	4	3	H	B	x				Gew. Ferkelkraut
<i>Impatiens glandulifera</i> ROYLE 1834	5	7	8=	7	7	T	K					Drüsiges Springkraut
<i>Impatiens noli-tangere</i> LINNAEUS 1753	4	6	5	x	6	T	W					Großes Springkraut
<i>Impatiens parviflora</i> DE CANDOLLE 1824	4	6	5	x	6	T	W					Kleinblütiges Springkraut
<i>Iris pseudacorus</i> LINNAEUS 1753	7	6	9=	x	7	A, G	C, G	x				Wasser-Schwertlilie
<i>Jasione montana</i> LINNAEUS 1753	7	6	3	3	2	H	M	x	V			Berg-Jasione
<i>Juncus articulatus</i> LINNAEUS 1753	8	x	9	x	2	H	F	x				Glieder-Binse
<i>Juncus compressus</i> JACQUN 1762	8	5	8=	7	5	G	F	x				Zusammengedrückte Binse
<i>Juncus effusus</i> LINNAEUS 1753	8	5	7	3	4	H	F	x				Flatter-Binse
<i>Juncus inflexus</i> LINNAEUS 1753	8	5	7~	8	4	H	F	x				Blaugrüne Binse
<i>Juncus subnodulosus</i> SCHRANK 1789	8	6	8	9	3	G, A	F	x	3	3		Stumpblütige Binse
<i>Knautila arenensis</i> (LINNAEUS) J. M. COULTER 1823	7	6	4	x	4	H	A	x				Wiesen-Witwenblume
<i>Lamium album</i> LINNAEUS 1753	7	x	5	x	9	H	B					Weißes Taubnessel
<i>Lamium amplexicaule</i> LINNAEUS 1753	6	6	4	7	7	T	S					Stängelumfassende Taubnessel
<i>Lamium purpureum</i> LINNAEUS 1753	7	5	5	5	7	T	B					Rote Taubnessel
<i>Lathyrus pratensis</i> LINNAEUS 1753	7	5	6	7	6	H, li	F	x				Wiesen-Platterbse
<i>Lemna minor</i> LINNAEUS 1753	7	5	11	x	6	A	G					Kleine Wasserlinse
<i>Lemna trisulca</i> LINNAEUS 1753	7	6	12	7	5	A	G					Untergetauchte Wasserlinse
<i>Leucanthemum vulgare</i> LAMARCK 1779	7	x	4	x	3	H	M	x				Wiesen-Margerite
<i>Lolium perenne</i> LINNAEUS 1753	8	6	5	7	7	H	B	x				Deutsches Weidelgras
<i>Lotus corniculatus</i> agg. LINNAEUS 1753	7	x	4	7	3	H	A	x				Gew. Hornklee
<i>Lotus pedunculatus</i> CAVANILLES 1793	7	5	8	6	4	H	F	x				Sumpf-Hornklee
<i>Luzula campestris</i> (LINNAEUS) DE CANDOLLE 1805	7	x	4	3	3	H	M	x	V	V		Feld-Hainsimse
<i>Luzula multiflora</i> (EHRHART) LEJEUNE 1811	7	x	5~	5	3	H	M	x				Vielblütige Hainsimse
<i>Lychnis flos-cuculi</i> LINNAEUS 1753	7	5	7~	x	x	H	F	x	3	V		Kuckucks-Lichtnelke
<i>Lyopus europaeus</i> LINNAEUS 1753	7	6	9=	8	8	A, H, G	F	x				Ufer-Wolfstrapp
<i>Lysimachia vulgaris</i> LINNAEUS 1753	6	x	8~	x	x	G	F	x				Gew. Gilbweiderich
<i>Lythrum salicaria</i> LINNAEUS 1753	7	5	8~	6	x	H	F	x				Gew. Blutweiderich
<i>Malus domestica</i> BORCKHAUSEN 1803	7	8	?	?	6	P	K					Kultur-Äpfel
<i>Malva neglecta</i> WALLROTH 1824	8	6	5	7	9	T	R					Weg-Malve
<i>Matricaria chamomilla</i> LINNAEUS 1753	7	6	5	5	5	T	S	x				Echte Kamille
<i>Medicago lupulina</i> LINNAEUS 1753	7	5	4	8	x	T, H	B	x				Hopfenklee

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	§/C	
Medicago x varia MARTYN 1792	8	6	4	7	x	H	D	x				Bastard-Luzerne
Melica uniflora REIZIUS 1779	3	5	5	6	6	G, H	W					Einblütiges Perlgras
Mentha aquatica LINNAEUS 1753	7	5	9=	7	5	G, A	F	x				Wasser-Minze
Molinia caerulea (LINNAEUS) MOENCH 17794	7	x	7	x	2	H	F	x				Pfeifengras
Myosotis arvensis (LINNAEUS) HILL 1764	6	6	5	x	6	T	B	x				Acker- Vergissmeinnicht
Myosotis scorpioides LINNAEUS 1753	7	x	8~	x	5	H	F	x				Sumpf-Vergissmeinnicht
Myosotis stricta RÖMER et SCHULTES 1819	8	6	3	6	2	T	M		V			Sand-Vergissmeinnicht
Myosotis sylvatica HOFFMANN 1791	6	x	5	x	7	H	W					Wald-Vergissmeinnicht
Ononis spinosa LINNAEUS 1753	8	6	4~	7	3	H	A	x	3			Dornige Hauhechel
Onopordum acanthium LINNAEUS 1753	9	7	4	7	8	H, T	R	x				Gew. Eselsdistel
Papaver argemone LINNAEUS 1753	6	6	4	5	5	T	S	x	V			Sand-Mohn
Papaver rhoeas LINNAEUS 1753	6	6	5	7	6	T	S	x				Klatsch-Mohn
Periscaria amphibia f. terr. (LINNAEUS) DELARBE 1800	8	6	x	x	6	A, G	F	x				Wasser-Knöterich
Periscaria lapathifolia (LINNAEUS) DELARBE 1800	6	6	8	x	8	T	B	x				Ampfer-Knöterich
Peucedanum palustre (LINNAEUS) MOENCH 1794	7	6	9=	x	4	H	F	x		V		Sumpf-Haarstrang
Phalaris arundinacea LINNAEUS 1753	7	5	8~	7	7	H, G, A	F	x				Rohr-Glanzgras
Pheum pratense LINNAEUS 1753	7	x	5	x	7	H	B	x				Wiesen-Lieschgras
Phragmites australis (CAVANILLES) STEUDEL 1841	7	5	10	7	7?	G, H	G	x				Gew. Schilf
Picris hieracioides LINNAEUS 1753	8	x	4	8	4	H	D	x				Gew. Bitterkraut
Pilosella officinarum F. W. SCHULTZ et SCHULTZ-BIP 1862	7	x	4	x	2	H	M	x				Kleines Mausohrblutschkraut
Pimpinella saxifraga LINNAEUS 1753	7	x	3	x	2	H	A	x				Kleine Pimpinelle
Plantago lanceolata LINNAEUS 1753	6	x	x	x	x	H	B	x				Spitz-Wegerich
Plantago major LINNAEUS 1753	8	x	5	x	6	H	B	x				Breit-Wegerich
Platanus x hispanica MÜNCHHAUSEN 1764	-	-	-	-	-	P	K					Bastard-Platane
Poa annua LINNAEUS 1753	7	x	6	x	8	H	B					Einjähriges Rispengras
Poa compressa LINNAEUS 1753	9	x	3	9	3	H, G	B	x				Plattalm-Rispengras
Poa pratensis LINNAEUS 1753	6	x	5	x	6	H, G	B	x				Wiesen-Rispengras
Poa trivialis LINNAEUS 1753	6	x	7	x	7	H	F	x				Gew. Rispengras
Polygonum aviculare LINNAEUS 1753	7	6	4	x	6	T	B	x				Echter Vogelknöterich
Populus x canadensis MOENCH 1785	-	-	-	-	-	P	K					Kanadische Pappel
Potentilla anserina LINNAEUS 1753	7	6	6~	x	7	H	F	x				Gänse-Fingerkraut
Potentilla argentea LINNAEUS 1753	9	6	2	3	1	H	M	x				Silber-Fingerkraut
Potentilla erecta (LINNAEUS) RÄUSCHEL 1797	6	x	x	x	2	H	F	x	V			Blutwurz
Potentilla reptans LINNAEUS 1753	6	6	6	7	5	H	B	x				Kriechendes Fingerkraut
Primula veris LINNAEUS 1753	7	x	4	8	3	H	A	x	V	V		Wiesen-Schlüsselblume
Prunella vulgaris LINNAEUS 1753	7	x	5	7	x	H	A	x				Kleine Braunelle
Prunus domestica LINNAEUS 1753	7	6	?	?	7	P	K					Kultur-Pflaume
Prunus serotina EHRLHART 1788	(6)	6	5	x	?	P, C	K					Spätblühende Traubenkirsche
Prunus spinosa LINNAEUS 1753	7	5	4	7	x	P	T	x				Gew. Schlehe
Pulmonaria obscura DUMORTIER 1865	4	5	6	8	7	H	W					Dunkles Lungenkraut
Quercus robur LINNAEUS 1753	(7)	6	x	x	x	P	W	x				Stiel-Eiche
Quercus rubra LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	P	K					Rot-Eiche
Ranunculus acris LINNAEUS 1753	7	x	6	x	x	H	B	x				Scharfer Hahnenfuß
Ranunculus bulbosus LINNAEUS 1753	8	6	3	7	3	G, H	A	x				Knolliger Hahnenfuß
Ranunculus flammula LINNAEUS 1753	7	x	9	3	2	A	F	x	V			Brennender Hahnenfuß
Ranunculus repens LINNAEUS 1753	6	x	7~	x	7?	H	B	x				Kriechender Hahnenfuß
Ranunculus sceleratus LINNAEUS 1753	9	6	9=	7	9	T	F					Gift-Hahnenfuß
Rhinanthus serotinus (SCHÖNHAUSER) OBORENY 1914	7	5	6~	7	2	H	A	x				Großer Klappertopf

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	§/C	
<i>Rorippa amphibia</i> (LINNAEUS) BESSER 1821	7	6	10	7	8	A	F	x				Wasser-Sumpfkresse
<i>Rorippa palustris</i> (LINNAEUS) BESSER 1821	7	x	8=	x	8	T	F					Gew. Sumpfkresse
<i>Rorippa sylvestris</i> (LINNAEUS) BESSER 1821	6	6	8=	8	6	H, G	F	x				Wilde Sumpfkresse
<i>Rosa canina</i> LINNAEUS 1753	8	5	4	x	x	P	T	x				Hunds-Rose
<i>Rubus spec.</i>	-	-	-	-	-	-	-	x				Brombeere
<i>Rumex acetosa</i> LINNAEUS 1753	8	x	x	x	6	H	B	x				Wiesen Sauerampfer
<i>Rumex acetosella</i> LINNAEUS 1753	8	5	3	2	2	G, H	M	x				Kleiner Sauerampfer
<i>Rumex crispus</i> LINNAEUS 1753	7	5	7~	x	6	H	B, F	x				Krauser Ampfer
<i>Rumex obtusifolius</i> LINNAEUS 1753	7	5	6	x	9	H	R					Sumpfblätriger Ampfer
<i>Salix alba</i> LINNAEUS 1753	5	6	8~	8	7	P	C					Silber-Weide
<i>Salix cinerea</i> LINNAEUS 1753	7	x	9~	5	4	C	C	x				Grau-Weide
<i>Salix pentandra</i> LINNAEUS 1753	7	5	8~	6	4	P	C					Lorbeer-Weide
<i>Salix repens</i> LINNAEUS 1753	8	5	7	x	x	C	T	x	3	V		Kriech-Weide
<i>Sambucus nigra</i> LINNAEUS 1753	7	5	5	x	9	C	W					Schwarzer Holunder
<i>Scirpus sylvaticus</i> LINNAEUS 1753	6	5	8	4	4	G, H	F	x				Wald-Sinse
<i>Scorzoneroïdes autumnalis</i> (LINNAEUS) MOENCH 1794	7	x	5	5	5	H	B	x				Herbst-Schuppenlöwenzahn
<i>Scrophularia umbrosa</i> DUMOTIER 1827	7	6	9=	8	7	A	F	x				Flügel-Braunwurz
<i>Scutellaria galericulata</i> LINNAEUS 1753	7	6	9=	7	6	H	F	x				Gew. Heimkraut
<i>Sedum acre</i> LINNAEUS 1753	8	6	2	x	1	C	M	x				Scharfer Mauerpfeffer
<i>Senecio jacobaea</i> LINNAEUS 1753	8	5	4~	7	5	H, T	D	x				Jakobs-Greiskraut
<i>Silene latifolia ssp. alba</i> (MILLER) GREUTER et BURDET 1982	8	6	4	x	7	H	B	x				Weiße Lichtnelke
<i>Solidago virgaurea</i> LINNAEUS 1753	5	x	5	x	4	H	D	x				Gew. Goldrute
<i>Sorbus aucuparia</i> LINNAEUS 1753	(6)	x	x	4	x	P	W	x				Eberesche
<i>Spergula arvensis</i> LINNAEUS 1753	6	5	5	3	6	T	S					Acker-Spergel
<i>Stachys palustris</i> LINNAEUS 1753	7	5	7~	7	6	G	F	x				Sumpf-Ziest
<i>Stachys sylvatica</i> LINNAEUS 1753	4	x	7	7	7	H	C					Wald-Ziest
<i>Stellaria aquatica</i> (LINNAEUS) SCOPII 1771	7	5	8=	7?	8	G, H	F	x				Gew. Wasserdarm
<i>Stellaria graminea</i> LINNAEUS 1753	6	x	5	4	3	H	B	x				Gras-Sternmiere
<i>Stellaria media</i> (LINNAEUS) VILLARS 1789	6	x	x	7	8	T	B	x				Vogelsternmiere
<i>Stellaria palustris</i> (ROTH) HOFFMANN 1791	5	5	9~	4	2	H	F	x	3	1	3	Graugrüne Sternmiere
<i>Succisa pratensis</i> MOENCH 1794	7	5	7	x	2	H	F	x	2	V		Gew. Teufelsabiss
<i>Symphoricarpos albus</i> (LINNAEUS) BLAKE 1914	6	4	?	?	7	C	K					Gew. Schneebere
<i>Symphytum officinale</i> LINNAEUS 1753	7	6	7	x	8	H, G	F	x				Gew. Beinwell
<i>Syringa vulgaris</i> LINNAEUS 1753	7	8	?	?	7	C, P	K					Gew. Flieder
<i>Tanacetum vulgare</i> LINNAEUS 1753	8	6	5	8	5	H	R					Rainfarn
<i>Taraxacum Sect. Ruderalia</i> KIRSCHNER, ØLLGAARD et ŠTEPANEK 1987	7	x	5	x	8	H	B	x				Wiesen-Löwenzahn-Gruppe
<i>Thelypteris palustris</i> SCHOTT 1834	5	6	8	5	6	G, A	F	x		3		Sumpffarn
<i>Thlaspi arvense</i> LINNAEUS 1753	6	5	5	7	6	T	S					Acker-Hellerkraut
<i>Tilia platyphyllos</i> SCOPII 1771	(4)	6	6	x	7	P	W					Sommer-Linde
<i>Tragopogon pratensis</i> LINNAEUS 1753	7	6	4	7	6	H	B	x				Wiesen-Bocksbart
<i>Trifolium arvense</i> LINNAEUS 1753	8	6	3	2	1	T	M	x				Hasen-Klee
<i>Trifolium dubium</i> SIBTHORP 1794	6	6	4	6	4	T	M	x				Kleiner Klee
<i>Trifolium pratense</i> LINNAEUS 1753	7	x	5	x	x	H	B	x				Wiesen-Klee
<i>Trifolium repens</i> LINNAEUS 1753	8	x	5	6	6	C, H	B	x				Weiß-Klee
<i>Triglochin palustris</i> LINNAEUS 1753	8	6	7=	x	5?	H	F	x	3	3		Sumpf-Dreizack
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (LINNAEUS) SCHULTZ 1844	7	6	x	6	6	T	S	x				Geruchlose Kamille
<i>Triticum aestivum</i> LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	T	S	x				Saat-Weizen
<i>Ulmus glabra</i> HUDSON 1762	(4)	5	6	7	7	P	W					Berg-Ulme
<i>Ulmus laevis</i> PALLAS 1784	(4)	6	8	7	7	P	W					Flatter-Ulme
<i>Urtica dioica</i> LINNAEUS 1753	x	x	6	7	9	H	R	x				Große Brennnessel

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	s/c	
<i>Valeriana dioica</i> LINNAEUS 1753	7	x	8	5?	2	G	F	x	3	V		Kleiner Baldrian
<i>Valeriana officinalis</i> LINNAEUS 1753	7	6	8~	7	5	H	F	x				Echter Arznei-Baldrian
<i>Valerianella locusta</i> (LINNAEUS) LATERRADE 1821	7	6	5	7	6?	T	S	x				Gew. Rapunzchen
<i>Verbascum thapsus</i> LINNAEUS 1753	8	x	4	7	7	T	D	x	3			Kleinblütige Königskerze
<i>Veronica arvensis</i> LINNAEUS 1753	7	5	5	6	6	T	S					Feld-Ehrenpreis
<i>Veronica beccabunga</i> LINNAEUS 1753	7	x	10	7	6	H	G, F	x				Bach-Ehrenpreis
<i>Veronica catenata</i> PENNELL 1921	7	7	9=	7	7	T, A	G, F					Roter Wasser-Ehrenpreis
<i>Veronica chamaedrys</i> LINNAEUS 1753	6	x	5	x	x	C	B	x				Gamander-Ehrenpreis
<i>Veronica scutellata</i> LINNAEUS 1753	7	5	9=	3	3	H, A	F	x	3			Schild-Ehrenpreis
<i>Veronica serpyllifolia</i> LINNAEUS 1753	5	5	6	5	7	H	M	x				Quendel-Ehrenpreis
<i>Vicia angustifolia</i> LINNAEUS 1754	5	6	x	x	x	T, ii	B	x				Saat-Wicke
<i>Vicia cracca</i> LINNAEUS 1753	7	5	6	x	x	H, ii	B	x				Vogel-Wicke
<i>Vicia hirsuta</i> (LINNAEUS) GRAY 1821	7	6	4	x	4	T	B	x				Behaarte Wicke
<i>Vicia sativa</i> LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	T	B	x				Saat-Wicke
<i>Vicia tetrasperma</i> (LINNAEUS) SCHREBER 1771	6	6	5	5	5	T, ii	B	x				Viersamige Wicke
<i>Vicia villosa</i> ROTH 1793	7	6	4	6	5	T, H, ii	B	x				Zottel-Wicke
<i>Viola arvensis</i> MURRAY 1770	6	5	x	x	x	T	S	x				Acker-Stiefmütterchen
<i>Viola tricolor</i> LINNAEUS 1753	7	x	4	x	x	H, T	M		3	V		Wildes Stiefmütterchen
<i>Viscum album</i> LINNAEUS 1753	7	6	?	?	?	hp, C	W					Gew. Mistel
Historische Funde												
<i>Anemone nemorosa</i> LINNAEUS 1753	x	x	5?	6	5	G	W	1986				Busch-Windröschen
<i>Apium repens</i> (JACQUIN) KOCH 1821	9	6	7	7	7?	A	F	2005	2 ii	1		Kriechender Sumpfsellerie
<i>Asperula cynanchica</i> LINNAEUS 1753	7	x	3	8	3	H	M	1819	1	V		Hügel-Meister
<i>Astragalus arenarius</i> LINNAEUS 1753	7	7	2?	7	1?	H	D	F	1	2		Sand-Tragant
<i>Astragalus cicer</i> LINNAEUS 1753	4	6	4~	9	2?	H	D	1986		3		Kicher-Tragant
<i>Atriplex prostrata</i> DE CANDOLLE 1805	8	6	6	x	9	T	S	1986				Spießblättrige Melde
<i>Baliota nigra</i> LINNAEUS 1753	8	6	5	x	8	H	R	1986	V			Schwarznessel
<i>Betula pubescens</i> EHRLHART 1791	7	x	8	3	3	P	C	2014				Moor-Birke
<i>Brachypodium pinnatum</i> (LINNAEUS) PAISLOT DE BEAUVOIS 1812	6	5	4	7	4	H, G	W	1988				Fieder-Zwenke
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (HUDSON) PAISLOT DE BEAUVOIS 1812	3	5	5	6?	6	H	W	1986				Wald-Zwenke
<i>Campanula trachelium</i> LINNAEUS 1753	4	x	6	8	8	H	D	1986				Nesselblättrige Glockenblume
<i>Carex praecox</i> ssp. <i>praecox</i> SCHREBER 1771	9	6	3~	x	4?	H, G	M	1974	2	3		Gew. Frühe Segge
<i>Carex pseudocyperus</i> LINNAEUS 1753	7	6	9	6	5	H, A	F	1986				Scheinzypergras-Segge
<i>Carlina vulgaris</i> LINNAEUS 1753	7	5	4	7	3	H	A	1988	3			Gew. Goldistel
<i>Catabrosa aquatica</i> (LINNAEUS) PAISLOT DE BEAUVOIS 1812	8	5	9=	7?	8	H, A	G		2	2		Quellgras
<i>Centaurium erythraea</i> RAFN 1800	8	6	5	6	6?	T	A	1986	3	V		Echtes Tausendgüldenkraut
<i>Ceratoophyllum demersum</i> LINNAEUS 1753	5	8	12	8	7?	A	G	1986				Raues Hornblatt
<i>Chaerophyllum temulum</i> LINNAEUS 1753	5	6	5	x	8	H, T	W	2014				Taunel-Kälberkropf
<i>Chenopodium hybridum</i> LINNAEUS 1753	7	6	5	8	8	T	S	1986	V			Stechapfelblättriger Gänsefuß
<i>Chenopodium polyspermum</i> LINNAEUS 1753	6	6	6	x	8	T	S	1986				Vielsamiger Gänsefuß
<i>Chenopodium rubrum</i> LINNAEUS 1753	8	x	6	x	9	T	S	1986				Roter Gänsefuß
<i>Circaea lutetiana</i> LINNAEUS 1753	4	5	6	7	7	G	W	1986				Großes Hexenkraut
<i>Circaea x intermedia</i> EHRLHART 1787	4	5	7	7	6	G	W	F				Mittleres Hexenkraut
<i>Corydalis cava</i> SCHWEIGER et KÖRTE 1811	3	6	6	8	7	G	W	2017				Hohler Lerchensporn
<i>Corynephorus canescens</i> (LINNAEUS) PAISLOT DE BEAUVOIS 1812	8	6	2	3	2	H	M	1988				Gew. Silbergras
<i>Cytisus scoparius</i> (LINNAEUS) LINK 1822	8	5	4	3	4	C	T					Gew. Besenginster

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	s/c	
<i>Dactylorhiza majalis</i> ssp. <i>majalis</i> (REICHENBACH) HUNT et SUMMERHAYES 1965	8	5	8~	7	3	T	F	1976	2 II	3		Gew. Breitblättrige Fingerwurz
<i>Dianthus superbus</i> LINNAEUS 1755	7	6	8~	8	8	H, G	M	1841	2	3		Pracht-Nelke
<i>Echinocystis lobata</i> (MICHXAUX) TORREY et GRAY 1840	7	8	9=	8?	8?	T	K	1986				Gelappte Stachelgurke
<i>Epilobium angustifolium</i> LINNAEUS 1753	8	x	5	5	8	H, G	W	1986				Schmalblättriges Weidenröschen
<i>Epilobium palustre</i> LINNAEUS 1753	7	5	9	3	2	H	F					Sumpf-Weidenröschen
<i>Epilobium roseum</i> SCHREBER 1771	7	6	9=	8	8	H	G	2014				Rosarotes Weidenröschen
<i>Epipactis palustris</i> (LINNAEUS) GRANTZ 1769	8	5	9~	8	2	G	C	1982	2 I	3		Sumpf-Sitter
<i>Fallopia sachalinensis</i> (SCHMIDT) RONSE DECRANE 1988	7	7	8=	7	8?	G	K	2014				Sachalin-Staudenknöterich
<i>Fragaria vesca</i> LINNAEUS 1753	7	x	5	x	6	H	T, W	1986				Wald-Erdbeere
<i>Frangula alnus</i> MILLER 1768	6	6	8~	4	x	C	C	1986				Echter Faulbaum
<i>Fraxinus excelsior</i> LINNAEUS 1753	4	5	x	7	7	P	W					Gew. Esche
<i>Galeopsis tetralix</i> LINNAEUS 1753	7	x	5	x	6	T	R	1986				Stechender Hohlzahn
<i>Gentiana cruciata</i> LINNAEUS 1753	7	6	3	8	3	H	F	1841	1	3		Kreuz-Enzian
<i>Geranium palustre</i> LINNAEUS 1756	7	5	7~	8	7	H	F	1986				Sumpf-Storchschnabel
<i>Geranium pusillum</i> BURBANK 1759	7	6	4	x	7	T	S	2014				Zwerg-Storchschnabel
<i>Glyceria maxima</i> (HARTMANN) HOLMBOE 1919	9	5	10	8	9	A, G	G	2014				Wasser-Schwaden
<i>Hemerocallis fulva</i> (LINNAEUS) LINNAEUS 1753	-	-	-	-	-	H, G	K	2014				Gelbrote Taglilie
<i>Hepatica nobilis</i> SCHREBER 1771	4	6	4	7	5	H	W	2009	V			Leberblümchen
<i>Hieracium sabaudum</i> LINNAEUS 1753	5	6	4	4	2	H	M	1986				Savoyer Habichtskraut
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> LINNAEUS 1753	7	6	11	7	6?	A	G	1986	V	3		Europäischer Froschbiss
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> LINNAEUS 1753	7	5	9~	3	2	H, A	G	1986	V			Gew. Wassernabel
<i>Lapsana communis</i> LINNAEUS 1753	5	6	5	x	7	T	R	2014				Rainkohl
<i>Lathyrus palustris</i> LINNAEUS 1753	8	6	8=	8	3	H	F	2000	3	3		Sumpf-Platterbse
<i>Lathyrus vernus</i> (LINNAEUS) BERNHARDI 1800	4	6	5	8	4?	G	W	1986				Frühlings-Platterbse
<i>Linum catharticum</i> LINNAEUS 1753	7	x	x	7	2	H	M	1988	3			Purgier-Lein
<i>Lysimachia nummularia</i> LINNAEUS 1753	4	6	6~	x	x	H	F	1986				Pfennig-Gilbweiderich
<i>Malva alcea</i> LINNAEUS 1753	8	6	5	8	7	H	D	1950				Siegmarswurz
<i>Malva sylvestris</i> LINNAEUS 1753	8	6	4	7?	8	T, H	D	1986				Wilde Malve
<i>Medicago minima</i> (LINNAEUS) LINNAEUS 1754	9	7	3	8	2	T	M	1988	2	3		Zwerg-Schneckenklee
<i>Melilotus officinalis</i> (LINNAEUS) LAMARCK 1779	8	6	3	8	3	T	D	1986				Echter Steinklee
<i>Menyanthes trifoliata</i> LINNAEUS 1753	8	x	9=	x	3?	A	G	1986	3	3		Fiebertklee
<i>Milium effusum</i> LINNAEUS 1753	4	x	5	5	5	H, G	W	1986				Wald-Flattergras
<i>Myriophyllum spicatum</i> LINNAEUS 1753	7	?	12	6	3	A	G	2007	V			Ähren-Tausendblatt
<i>Najas marina</i> LINNAEUS 1753	5	6	12	9	6?	T, A	G	2008	2	3		Großes Nixkraut
<i>Nasturtium microphyllum</i> (BONNINGHAUSEN) REICHENBACH 1832	6	4	10	?	7	A	G	1986				Einreihige Brunnenkresse
<i>Nuphar lutea</i> (LINNAEUS) SMITH 1809	8	6	11	7	6	A	G	1986				Gelbe Teichrose
<i>Nymphaea alba</i> LINNAEUS 1753	8	6	11	7	5	A	G	2007				Weiße Seerose
<i>Oxalis acetosella</i> LINNAEUS 1753	1	x	5	4	9	H, G	W	1986				Wald-Sauerklee
<i>Paris quadrifolia</i> LINNAEUS 1753	3	x	6	7	7	G	W	1986				Einbeere
<i>Plantago arenaria</i> WALDSTEIN et KITABEL 1801	8	7	4	7	5	T	M	1988	1			Sand-Wegerich
<i>Poa nemoralis</i> LINNAEUS 1753	5	x	5	5	4	H	W	1986				Hain-Rispengras
<i>Poa palustris</i> LINNAEUS 1759	7	5	9=	8	7	H	G	2014				Sumpf-Rispengras
<i>Polygonatum multiflorum</i> (LINNAEUS) ALLIONI 1785	2	x	5	6	5	G	W	1986				Vielblütige Weißwurz
<i>Potamogeton filiformis</i> PERSOON 1805	8	4	12	4	3	A	G	1989	1	V		Faden-Laichkraut
<i>Potamogeton lucens</i> LINNAEUS 1753	6	6	12	6	7	A	G	2007		V		Spiegelndes Laichkraut
<i>Potamogeton natans</i> LINNAEUS 1753	6	5	11	7	5	A	G	2008				Schwimmendes Laichkraut

Botanische Namen	Zeigerwerte					L	BP	V	Gefährdung			Deutsche Namen
	L	T	F	R	N				MV	D	§/c	
Potamogeton pectinatus LINNAEUS 1753	6	x	12	4	3	A	G	2007				Kamm-Laichkraut
Potamogeton perfoliatus LINNAEUS 1753	6	x	12	7	6	A	G	2008		V		Durchwachsenes Laichkraut
Potamogeton praelongus WULFEN 1805	8	4	12	8	4	A	G	1989		2		Gestrecktes Laichkraut
Potamogeton pusillus LINNAEUS 1753	6	5	12	6	x	A	G	2008	3	V		Zwerg-Laichkraut
Pyrus pyraeater (LINNAEUS) BURSDORF 1787	6	7	?	?	4	P	T	1986	3			Wild-Birne
Ranunculus circinatus SIBTHORP 1794	6	6	12	7	8?	A	G	2007		V		Spreizender Hahnenfuß
Ranunculus lanuginosus LINNAEUS 1753	3	6	6	7	7	H	W	1986				Wolliger Hahnenfuß
Ranunculus lingua LINNAEUS 1753	7	x	10	6	7	A	G	2000	3	3		Zungen-Hahnenfuß
Rhynchospora fusca (LINNAEUS) AITON 1810	8	5	9=	1	2	H, G	F	1841	11	2		Braunes Schnabelried
Ribes nigrum LINNAEUS 1753	4	x	9=	6	5	C	C	2014				Schwarze Johannisbeere
Ribes uva-crispa LINNAEUS 1753	4	5	x	x	6	C	W	1986				Stachelbeere
Rosa elliptica TAUSCH 1819	8	6	3	8	3	C	T	1992	2	3		Elliptische Rose
Rumex hydrolapathum HUDSON 1778	7	6	10	7	7	A	G	2014				Fluss-Ampfer
Rumex palustris SMITH 1800	8	7	9=	9?	8?	T	F	2014	V			Sumpf-Ampfer
Salix fragilis LINNAEUS 1753	5	5	8=	6	6	P	C	2014				Bruch-Weide
Salix viminalis LINNAEUS 1753	7	6	8=	7	x	P, C	C	2014				Korb-Weide
Sanguisorba minor SCOPOLI 1771	7	6	3	8	2	H	A	1988	3			Kleiner Wiesenknopf
Schoenoplectus lacustris (LINNAEUS) PALLAS 1888	8	6	11	7	6	G, A	G	2007				Gew. Teichsinse
Scrophularia nodosa LINNAEUS 1753	4	5	6	6	7	H	W	1986				Knoten-Braunwurz
Senecio vulgaris LINNAEUS 1753	7	x	5	x	8	T	R	1986				Gew. Greiskraut
Silene dioica (LINNAEUS) CLAIRVILLE 1811	x	x	6	7	8	H	B	1986				Rote Lichtnelke
Solanum dulcamara LINNAEUS 1753	7	5	8~	x	8	C, II	G	1986				Bittersüßer Nachschatten
Sparanium erectum LINNAEUS 1753	7	6	10	7	7	A	G	1986				Ästiger Igelkolben
Stellaria nemorum LINNAEUS 1753	4	x	7	5	7	H	C, W	2014				Hain-Sternmiere
Stratiotes aloides LINNAEUS 1753	7	6	11	8	6	A	G	1986	3	3		Krebsschere
Trifolium alpestre LINNAEUS 1763	7	6	3~	6	3	H	A	1986	3	V		Hügel-Klee
Trifolium hybridum LINNAEUS 1753	7	6	6	7	5	H	B	1986				Schweden-Klee
Trifolium medium LINNAEUS 1759	7	6	4	6	3	H	K	1986				Zickzack-Klee
Typha latifolia LINNAEUS 1753	8	6	10	7	8	A	G	1986				Breitblättriger Rohrkolben
Utricularia vulgaris LINNAEUS 1753	7	6	12	5?	4	A	W	1986	3	3		Gew. Wasserschlauch
Valerianella rimosa BASTARD 1814	6	7	4	7	5?	T	S	F	2	3		Gefurchtes Rapünzchen
Verbascum nigrum LINNAEUS 1753	7	5	5	7	7	H	D	1986				Schwarze Königskerze
Veronica anagallis-aquatica LINNAEUS 1753	7	6	9=	x	6	T, A	G	1986				Blauer Wasser-Ehrenpreis
Veronica prostrata ssp. prostrata LINNAEUS 1762	9	7	2	7	2	H	A	1841	1	3		Gew. Niederliegender Ehrenpreis
Viburnum opulus LINNAEUS 1753	6	5	x	7	6	C	W	1986				Gew. Schneeball
Vicia sepium LINNAEUS 1753	x	x	5	6	5	H	B	1986				Zaun-Wicke
Viola riviniana REICHENBACH 1823	5	x	4	4	x	H	W	1986				Hain-Veilchen

Legende:

Lichtzahl	Temperaturzahl	Feuchtezahl	Reaktionszahl
1 (Tief Schattenpflanzen) 2 (zw. 1 und 3) 3 (Schattenpflanze) 4 (zw. 3 und 5) 5 (Halbschattenpflanze) 6 (zw. 5 und 7) 7 (Halblichtpflanze) 8 (Lichtpflanze) 9 (Volllichtpflanze)	1 (Kältezeiger) 2 (zw. 1 und 3) 3 (Kühzeiger) 4 (zw. 3 und 5) 5 (Mäßigwarmezeiger) 6 (zw. 5 und 7) 7 (Warmezeiger) 8 (zw. 7 und 9) 9 (extremer Wärmezeiger)	1 (Starkrockniszeiger) 2 (zw. 1 und 3) 3 (Trockenniszeiger) 4 (zw. 3 und 5) 5 (Fischezeiger) 6 (zw. 5 und 7) 7 (Feuchte-/Wechselfeuchtezeiger) 8 (zw. 7 und 9) 9 (Nässezeiger) 10 (Wechselwasserzeiger) 11 (Wasserpflanze) 12 (Unterwasserpflanze)	1 (Starksäurezeiger) 2 (zw. 1 und 3) 3 (Säurezeiger) 4 (zw. 3 und 5) 5 (Mäßigsäurezeiger) 6 (zw. 5 und 7) 7 (Schwachsäure-/Schwachbasenzeiger) 8 (zw. 7 und 9) 9 (Basen- und Kalkzeiger)
x indifferentes Verhalten ? ungekärtes Verhalten		= (Überschwemmungszeiger) ~ (Zeiger für starken Wechsel)	
Stickstoffzahl	L (Lebensform)	BP (Biotoptpräferenz)	
1 (stickstoffärmste Standorte) 2 (zw. 1 und 3) 3 (stickstoffarme Standorte) 4 (zw. 3 und 5) 5 (mäßig stickstoffreiche Standorte) 6 (zw. 5 und 7) 7 (an stickstoffreichen Standorten häufiger) 8 (Stickstoffzeiger) 9 (an extrem stickstoffreichen Standorten konzentriert)	A (Helio- und Hydrophyt) C (krautiger Chamaephyt) E (Epiphyt, nur für Moose) G (Geophyt, nur für höh. Pfl.) B (Helophyt) H (Hemikryptophyt) P (Phanerophyt, nur für höh. Pfl.) T (Therophyt) li (Liane/Spreizklimmer) ep (Epiphyt) hp (Halbparasit)	A (basiphile Magerrasen, Trocken- und Halbrockenrasen) B (Frischgrünland, Trittrasen) C (Feuchtwälder / -gebüsche) D (thermophile Säume) F (Feuchtgünland / -brachen, Niedermoor, Flutrasen) G (Fließ- und Standgewässer) K (Park- / Kultur- und Nutzpflanzen) M (saure Mager- und Trockenrasen) R (Staudensäume, Ruderalfluren) S (Segetalflora / Äcker und Ephemeren) T (Trockengebüsche) W (Wälder und Feldgehölze)	

Gefährdung nach der Rote Liste Deutschland (D) und MV (MV)

- 0 (ausgestorben oder verschollen)
- 1 (vom Aussterben bedroht)
- 2 (stark gefährdet)
- 3 (gefährdet)
- 4 (potentiell vom Aussterben bedroht)
- R (extrem selten)
- G (Gefährdung gegeben, Gefährungsgrad unsicher)
- V (Sippen, die noch nicht bestandsgefährdet sind, deren Populationen aber zurückgehen)

Handlungserfordernis nach FSK

- iii: (Sehr hohes Handlungserfordernis)
- ii: (Hohes Handlungserfordernis)
- i: (Mäßiges Handlungserfordernis)

V (Vorkommen)

- (Fund außerhalb aller VA)
- x (Fund in VA)
- [Jahr] (Jahr des historischen Fundes)
- F (historische Fehlbestimmung)

Bundesartenschutzverordnung und Waschingtoner Artenschutzabkommen

- § (geschützt nach Bundesartenschutzverordnung)
- C (geschützt nach dem Waschingtoner Artenschutzabkommen)

9.3 Koordinaten der VA: Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N)

VA Nummer	Rechtswert	Hochwert	Unschärfe [m]
1	33377541	5926673	50
2	33377645	5926641	30
3	33377643	5926513	20
4	33377254	5926159	30
5	33377313	5925963	40
6	33377165	5925449	30
7	33376352	5923801	15
8	33376633	5923730	20
9	33376917	5923596	25
10	33376986	5923560	20
11	33377240	5923480	30
12	33377395	5923403	15
13	33377442	5923367	20
14	33377506	5923353	20
15	33377846	5923087	20
16	33378171	5922975	35
17	33378393	5923265	30
18	33378746	5923439	20
19	33378931	5923640	40
20	33379038	5923807	25
21	33379184	5923961	40
22	33379267	5924126	30
23	33379134	5924276	40
24	33379384	5924263	25
25	33379367	5924382	40
26	33379249	5924484	15
27	33379145	5924548	15
28	33379318	5924531	15
29	33379306	5924631	60
30	33379394	5924764	20
31	33379335	5924880	15
32	33379308	5924970	15
33	33379403	5925019	30
34	33379489	5925307	50
35	33378975	5925943	4
36	33379019	5925877	3
37	33379082	5925714	3
38	33378924	5925464	3
39	33378797	5925380	3
40	33378871	5925333	3
41	33378972	5925163	3
42	33378568	5925415	20
43	33378150	5924854	20
44	33377834	5924643	30
45	33377703	5924669	30

Datum:	06.06.2019	Bearbeiter:	Gordon Kabelmann	Nummer:	VA 02		
Größe in m:	5	X	5	=	25 m ²	Koordinaten*:	33377645/5926641 / 30m
Blütop:		GFM		Blühaspekt:		Ranunculus acris	

Gesamt-Deckung (%) (lebende Pflanzmasse)	Schicht-Höhe	Relief	Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
98		X eben		Torf, natürlich
Baum-Schicht (%)	-	wellig	N	X Torf, degradiert
Strauch-Schicht (%)	-	kuppig	NO	Antof
Kraut-Schicht (%)	40	dünn		Sand
Moose (gesamt) (%)	10	Berg/Rücken	O	Kies/Steine
Flechten (gesamt) (%)	-	Riedel/Vorsprung	S	Lehm
Streuschicht (%)	-	Flachhang < 9°	SW	Ton
Roßboden (%)	2	Steilhang > 9°	W	Halbkalk/Kalk
		Niesche		

Humusform/Humusaufage (nur wenn ansprechbar)	Wasserstufe	Schätzskala der Deckung
Müll	dür 5-	$r = <1\%$, 1-3Exemplare
Moder	sehr trocken 4-	$2m = 1-5\%$, über 50 Exemplare
Rohhumus	trocken 3-	$1 = 1-5\%$
	mäßig trocken	$2a = 5-12,5\%$
	frisch 1	$2b = 12,5-25\%$
	mäßig feucht 2+	
	feucht 3+	
	wechselfeucht	
	halbnass 4+	
	wechsellass	
	nass 5+	
	offenes Wasser 6+	
	quellig	
	Qualmwassereinfluss	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum:	06.06.2019	Bearbeiter:	Gordon Kabelmann	Nummer:	VA 03
Größe in m:	5	X	5	=	25 m ²
				Koordinaten*:	33377643,5926513 / 20
Pflanzart:	Juncus subnodulosus				
Blütenfarbe:	GFM				

Gesamt-Deckung (%) (lebende Phytomasse)	Schicht-Höhe	Relief	Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
98		X eben		Torf, natürlich
Baum-Schicht (%)	-	wellig	N	X Torf, degradiert
Strauch-Schicht (%)	-	kuppig	NO	Antofr
Kraut-Schicht (%)	40	dünn		Sand
Moose (gesamt) (%)	95	Berg/Rücken	O	Kies/Steine
Flechten (gesamt) (%)	35	Riedel/Vorsprung	SO	Lehm
Streu-Schicht (%)	-	Flachhang < = 9 °	S	Ton
Roßboden (%)	-	Steilhang > = 9 °	SW	Halbkalk/Kalk
	2	Niesche	W	

Humusform/Humusauflage (nur wenn ansprechbar)		Wasserstufe		Schätzskala der Deckung	
Müll	cm	dür 5-	wechselfeucht	r = <1%, 1-3Exemplare	2m = 1-5%, über 50 Exemplare
Moder	cm	sehr trocken 4-	halbonass 4+	+ = <1%	3 = 25-50%
Rohhumus	cm	trocken 3-	wechsellass	1 = 1-5%	4 = 50-75%
		mäßig trocken	nass 5+	2a = 5-12,5%	5 = 75-100%
		frisch 1	offenes Wasser 6+	2b = 12,5-25%	
		mäßig feucht 2+	quellig		
		feucht 3+	Qualmwassereinfluss		

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum:	06.06.2019	Bearbeiter:	Gordon Kabelmann	Nummer:	VA 04
Größe in m:	5	X	5	=	25 m ²
				Koordinaten*:	33377254,5926159 / 30m
Pflanztopf:		Blütenaspekt:		Potentialia reptans	
		GMF			

Gesamt-Deckung (%) (lebende Pflanzmasse)	Schicht-Höhe	Relief	Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
99		X eben		Torf, natürlich
Baum-Schicht (%)	-	X wellig	N	
Strauch-Schicht (%)	-	kuppig	NO	Torf, degradiert
Kraut-Schicht (%)	99	dünn	X O	Antof
Moose (gesamt) (%)	<1	Berg/Rücken	SO	Sand
Flechten (gesamt) (%)	-	Riedel/Vorsprung	S	Kies/Steine
Streu-Schicht (%)	-	Flachhang < 9 °	SW	Lehm
Roßboden (%)	1	Steilhang > 9 °	W	Ton
		Niesche		Halbkalk/Kalk

Humusform/Humusauflage (nur wenn ansprechbar)		Wasserstufe		Schätzskala der Deckung	
Müll	cm	1	dür 5-	wechselfeucht	r = <1%, 1-3Exemplare
Moder	cm		sehr trocken 4-	halbnass 4+	2m = 1-5%, über 50 Exemplare
Rohhumus	cm		trocken 3-	wechsellnass	3 = 25-50%
			mäßig trocken	nass 5+	4 = 50-75%
		X	frisch 1	offenes Wasser 6+	2a = 5-12,5%
			mäßig feucht 2+	quellig	2b = 12,5-25%
			feucht 3+	Qualmwassereinfluss	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 09.06.2019

Bearbeiter:

Gordon Käbelmann

Nummer:

VA 14

Größe in m:	5	X	5	=	25	m ²
-------------	---	---	---	---	----	----------------

Koordinaten*: 33377506,5923353 / 20m

Biotop: TMS

Blühaspekt:

Festuca rubra ssp. rubra

Gesamt-Deckung (%) (lebende Phytomasse)	Schicht-Höhe
90	

Baum-Schicht (%)	-	-	m
Strauch-Schicht (%)	-	-	m
Kraut-Schicht (%)	85	50	cm
Moose (gesamt) (%)	10	<1	cm
Flechten (gesamt) (%)	-	-	-
Streu-Schicht (%)	-	-	cm
Roßboden (%)	10	-	-

	Relief
	eben
X	wellig
	kuppig
	dünn
	Berg/
	Riedel
	Flach
	Steilh
	Niesch
	Senke
	Kerbt
	Schle

Hangneigung in G
bei Exposition

Substrat
Torf, natürlich
Torf, degradiert
Antorf
X Sand
Kies/Steine
Lehm
Ton
Halbkaik/kaik
Schlamm/Faueschlamm
gestörter Boden

Humusform/Humusauflage
(nur wenn ansprechbar)

	Mull	cm
	Moder	cm
	Rohhumus	cm

Wasserstufe

	dürr 5-
	sehr trocken 4-
X	trocken 3-
X	mäßig trocken
	frisch 1
	mäßig feucht 2+
	feucht 3+

	wechselfeucht
	halbnass 4+
	wechsellnass
	nass 5+
	offenes Wasser
	quellig
	Quellwasser

Schätzskala der Deckung	
$r < 1\%$, 1-3Exemplare	2m = 1-5%, über 50 Exemplare
+ = <1%	3 = 25-50%
1 = 1-5%	4 = 50-75%
2a = 5-12,5%	5 = 75-100%
2b = 12,5-25%	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 13.06.2019 Bearbeiter: Gordon Käbelmann Nummer: VA.18

Größe in m: 5 X 5 = 25 m² Koordinaten*: 33378746,5923439 / 20m

Biotop: TMS Blühaspekt: Artemisia campestris und Bromus hordeaceus

Gesamt-Deckung (%) (lebende Phytomasse)	80	Schicht-Höhe				Relief				Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat		
Baum-Schicht (%)	-	m	☐	☐	☐	eben	☐	☐	☐	☐	☐	Torf, natürlich	
Strauch-Schicht (%)	-	m	☐	☒	☐	wellig	☐	☐	☐	☐	☐	Torf, degradiert	
Kraut-Schicht (%)	80	cm	☐	☐	☐	dünn	☐	☐	☐	☐	☐	Antorf	
Moose (gesamt) (%)	-	cm	☐	☐	☐	Berg/Rücken	☐	☐	☐	☐	☐	Sand	
Flechten (gesamt) (%)	-		☐	☐	☐	Riedel/Vorsprung	☐	☐	☐	☐	☐	Kies/Steine	
Streu-Schicht (%)	5		☐	☐	☐	Flachhang < = 9 °	☐	☐	☐	☐	☐	Lehm	
Rohboden (%)	20	<1 cm	☐	☐	☐	Steilhang > = 9 °	☐	☐	☐	☐	☐	Ton	
			☐	☐	☐	Niesche	☐	☐	☐	☐	☐	Halbkaik/Kaik	
			☐	☐	☐	Senke	☐	☐	☐	☐	☐	Schlamm/Faueschlamm	
			☐	☐	☐	Kerbtal	☐	☐	☐	☐	☐	gestörter Boden	
			☐	☐	☐	Sohlental	☐	☐	☐	☐	☐		

Humusform/Humusauflage (nur wenn ansprechbar)	☐ Mull ☐ Moder ☐ Rohhumus	Wasserstufe	☐ dürr 5- ☐ sehr trocken4- ☒ trocken 3- ☐ mäßig trocken ☐ frisch 1 ☐ mäßig feucht 2+ ☐ feucht 3+	☐ wechselfeucht ☐ halbnass 4+ ☐ wechsellnass ☐ nass 5+ ☐ offenes Wasser 6+ ☐ quellig ☐ Qualmwasserreinfluss	Schätzskala der Deckung r = <1%; 1-3Exemplare + = <1% 1 = 1-5% 2b = 5-12.5% 2b = 12.5-25%	2m = 1-5%, über 50 Exemplare 3 = 25-50% 4 = 50-75% 5 = 75-100%
--	--	-------------	--	--	--	---

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F, Artname, Artmächtigkeit)

K	Allium sativum	r			
K	Artemisia absinthium	+			
K	Artemisia campestris	2b			
K	Bromus hordeaceus	2b			
K	Carex hirta	r			
K	Centaurea scabiosa	+			
K	Cerastium semidecandrum	+			
K	Convolvulus arvensis	+			
K	Coryza canadensis	r			
K	Dactylis glomerata	+			
K	Echium vulgare	+			
K	Equisetum arvense	+			
K	Falcaria vulgaris	+			
K	Festuca brevipila	1			
K	Festuca ovina	+			
K	Galium album	1			
K	Geranium molle	+			
K	Hylotelephium telephium	r			
K	Lolium perenne	+			
K	Plilosella officinarum	+			
K	Plantago lanceolata	+			
K	Poa pratensis	r			
K	Potentilla argentea	+			
K	Quercus robur	r			
K	Rumex acetosella	1			
K	Sedum acre	+			
K	Senecio jacobaea	+			
K	Tragopogon pratensis	+			
K	Trifolium arvense	r			
K	Triticum aestivum	r			
K	Veronica chamaedrys	r			
K	Veronica serpyllifolia	r			
K	Vicia hirsuta	+			
K	Vicia villosa	1			

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 13.06.2019

Bearbeiter:

Gordon Käbelmann

Nummer:

VA 20

Größe in m:	5	X	5	=	25	m ²
-------------	---	---	---	---	----	----------------

Koordinaten*: 33379038,5923807 / 25m

Biotop: GMF/TMS

Blühaspekt:

Potentilla reptans

Gesamt-Deckung (%) (lebende Phytomasse)	95	Schicht-Höhe
--	----	--------------

Baum-Schicht (%)	-	m
Strauch-Schicht (%)	-	m
Kraus-Schicht (%)	95	40 cm
Moose (gesamt) (%)	5	<1 cm
Flechten (gesamt) (%)	-	-
Streu-Schicht (%)	-	-
Roßboden (%)	5	cm

Relief	
eben	
wellig	
kuppig	X
ding	
Berg/Rücken	
Riedel/Vorsprung	
Flachhang $< 9^\circ$	
Steilhang $> 9^\circ$	
Niesche	
Senke	
Kerbtal	
Schenthal	

Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
N	Torf, natürlich
NO	Torf, degradient
O	Antorf
SO	X Sand
S	Kies/Steine
SW	X Lehm
X W	Ton
NW	Halbkalk/kaik
	Schlamm/Faueschlamm
	gestörter Boden

Humusform/Humusauflage
(nur wenn ansprechbar)

	Mull	cm
	Moder	cm
	Rohhumus	cm

Wasserstufe

	dürr 5-
	sehr trocken 4-
	trocken 3-
	mäßig trocken
X	frisch 1
	mäßig feucht 2+
	feucht 3+

	wechselfeucht
	halbnass 4+
	wechsellnass
	nass 5+
	offenes Wasser 6+
	quellig
	Qualmwassereinfluss

Schätzskala der Deckung

$r < 1\%$, 1-3 Exemplare	2m = 1-5%, über 50 Exemplare
+ = <1%	3 = 25-50%
1 = 1-5%	4 = 50-75%
2a = 5-12,5%	5 = 75-100%
2b = 12,5-25%	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname: Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum:	16.06.2019	Bearbeiter:	Gordon Käbelmann	Nummer:	VA 24
Größe in m:	5	X	5	=	25 m ²
				Koordinaten*:	33379384,5924263 / 25m
Bluttopf:	TMS	Blühaspekt:		Rumex acetosella	

Gesamt-Deckung (%) (lebende Pflanzmasse)	Schicht-Höhe	Relief	Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
98		X eben		Torf, natürlich
Baum-Schicht (%)	-		N	Torf, degradiert
Strauch-Schicht (%)	-	kuppig	NO	Antorf
Kraut-Schicht (%)	85	dünn	O	Sand
Moose (gesamt) (%)	30	Berg/Rücken	SO	Kies/Steine
Flechten (gesamt) (%)	-	Riedel/Vorsprung	S	X Lehm
Streuschicht (%)	<1	Flachhang < = 9 °	SW	Ton
Strohboden (%)	2	Steilhang > = 9 °	W	Halbkaik/Kaik
		Nische		

Humnsform/Humnsauflage (nur wenn anspr. redhar)	Wasserstufe	Schätzskala der Deckung
Müll	1 dürr 5- sehr trocken 4-	$r < 1\%$; 1-3 Exmplate 2m = 1-5%; über 50 Exmplate 3 = 25-50%
Moder	trocken 3- mäßig trocken	$r = < 1\%$ 1 = 1-5% 4 = 50-75%
Rohhumus	X frisch 1 mäßig feucht 2+ feucht 3+	2a = 5-12.5% 2b = 12.5-25% 5 = 75-100%
		wechselfeucht halbnass 4+ wechselfeucht nass 5+ offenes Wasser 6+ quellend Qualmwasseranfluss

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum:	16.06.2019	Bearbeiter:	Gordon Käbelmann	Nummer:	VA 26
Größe in m:	5	X	5	=	25 m ²
Biotopt:	TMS	Blühspekt:	Koordinaten*: 33°79'24,9" / 15m		
			Artemisia campestris und Sedum acre		

Gesamt-Deckung (%) (lebende Pflanzmasse)	Schicht-Höhe	Relief	Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
75		eben		Torf, natürlich
		X wellig		Torf, degradiert
Baum-Schicht (%)	-	kuppig	N	Antorf
Strauch-Schicht (%)	-	dünn	NO	
Kraut-Schicht (%)	75	Berg/Rücken	O	X Sand
Moose (gesamt) (%)	<1	Riedel/Vorsprung	SO	Kies/Steine
Flechten (gesamt) (%)	-	Flachhang < = 9 °	X S	Lehm
Streu-Schicht (%)	-	Steilhang > = 9 °	SW	Ton
Roßboden (%)	25	Niesche	W	Halbkaik/kaik

Humnusform/Humnusaufage (nur wenn ansprechbar)	Wasserstufe	Schätzskala der Deckung
Müll	dür 5- sehr trocken 4-	$r < 1\%$; 1-3Exemplare 2m = 1-5%; über 50 Exemplare
Moder	trocken 3- mäßig trocken	$+ < 1\%$ 1 = 1-5% 4 = 50-75% 2a = 5-12.5% 2b = 12.5-25%
Rohhumus	mäßig trocken frisch 1 mäßig feucht 2+ feucht 3+	wechsellnass 4+ halbnass 4+ wechsellnass nass 5+ offenes Wasser 6+ quellend Quellwasserinfluss

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 16.06.2019

Bearbeiter:

Gordon Käbelmann

Nummer:

VA 29

$$\frac{\text{Größe in m:}}{5} \cdot X = \frac{25}{5} \text{ m}^2$$

Koordinaten*: 33379306,5924631 / 60m

Biotop: GMF/ABM

Blühaspekt:

Achillea millefolium und Dactylis glomerata

Gesamt-Deckung (%) (lebende Phytomasse)	95	Schicht-Höhe
--	----	--------------

Baum-Schicht (%)	-	m
Strauch-Schicht (%)	-	m
Kraut-Schicht (%)	90	48 cm
Moose (gesamt) (%)	20	<1 cm
Flechten (gesamt) (%)	-	-
Streu-Schicht (%)	-	cm
Roßboden (%)	5	-

Relief	Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
X eben		Torf, natürlich
wellig		Torf, degradient
kuppig		Antorf
dünig	N	X Sand
Berg/Rücken	NO	X Kies/Steine
Riedel/Vorsprung	O	Lehm
Flachhang < = 9 °	SO	X Ton
Steilhang > = 9 °	S	Halbkalk/Kalk
Niesche	SW	Schlamm/Faustschlamm
Senke	W	gestörter Boden
Kerbtal	NW	
Sohlental		

Humusform/Humusaufgabe
(nur wenn ansprechbar)

	Mull	cm
	Moder	cm
	Rohhumus	cm

	Wasserstufe
	dür 5-
	sehr trocken 4-
	trocken 3-
	mäßig trocken
X	frisch 1
	mäßig feucht 2+
	feucht 3+

	wechselfeucht
	halbnass 4+
	wechsellnass
	nass 5+
	offenes Wasser 6+
	quellig
	Qualmwassereinfluss

Schätzskala der Deckung

$r = <1\%$, 1-3 Exemplare	$2m = 1-5\%$, über 50 Exemplare
$+ = <1\%$	$3 = 25-50\%$
$1 = 1-5\%$	$4 = 50-75\%$
$2a = 5-12,5\%$	$5 = 75-100\%$
$2b = 12,5-25\%$	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 16.06.2019

Bearbeiter:

Gordon Käbelmann

Nummer:

VA 32

$$\frac{\text{Größe in m:}}{5} \times \frac{5}{5} = \frac{25}{5} \text{ m}^2$$

Koordinaten*: 33379308,5924970 / 15m

Biotop: RHU

Blühaspekt:

Urtica dioica

Gesamt-Deckung (%) (lebende Phytomasse)	100	Schicht-Höhe
--	-----	--------------

Baum-Schicht (%)	-	m
Strauch-Schicht (%)	-	m
Kraus-Schicht (%)	100	90 cm
Moose (gesamt) (%)	-	cm
Flechten (gesamt) (%)	-	-
Streu-Schicht (%)	-	cm
Roßboden (%)	0	

Relief	X
eben	
wellig	
kuppig	
dünig	
Berg/Rucken	
Riedel/Vorsprung	
Flachhang $< 9^\circ$	
Steilhang $> 9^\circ$	
Niesche	
Senke	
Kerbtal	
Schlenktal	

Hangneigung in Grad bei Exposition	Substrat
N	Torf, natürlich
NO	X Torf, degradiert
O	Antorf
SO	Sand
S	Kies/Steine
SW	Lehm
W	Ton
NW	Halbkalk/Kalk
	Schlamm/Faeschlamm
	gestörter Boden

Humusform/Humusauflage
(nur wenn ansprechbar)

	Mull	cm
	Moder	cm
	Rohhumus	cm

Wasserstufe

	dürr 5-
	sehr trocken 4-
	trocken 3-
	mäßig trocken
	frisch 1
	mäßig feucht 2+
X	feucht 3+

Schätzskala der Deckung
 $r < 1\%$: 1-3 Exemplare $2m = 1-5\%$, über 50 Exemplare

	wechselfeucht
	halbnass 4+
	wechsellnass
	nass 5+
	offenes Wasser 6+
	quellig
	Qualmwassereinfluss

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 16.06.2019 Bearbeiter: Gordon Käbelmann Nummer: VA 33

Größe in m: 5 X 5 = 25 m² Koordinaten*: 33379403,5925019 / 30m

Pflanzengattung: Bromus hordeaceus

Blütenaspekt: GMF

	Gesamt-Deckung (%) (lebende Pflanzmasse)	Schicht-Höhe
Baum-Schicht (%)	-	m
Strauch-Schicht (%)	-	m
Kraut-Schicht (%)	90	60 cm
Moose (gesamt) (%)	<1	cm
Flechten (gesamt) (%)	-	-
Streu-Schicht (%)	-	cm
rohboden (%)	10	-

Relief	Hängegelung in Grad bei Exposition	Substrat
eben		Torf, natürlich
X wellig		Torf, degradiert
kuppig	N	Antorf
dünig	NO	Sand
Berg/Rücken	O	Kies/Steine
Riedel/Vorsprung	SO	Lehm
Flachhang < 9 °	S	X
Steilhang > 9 °	SW	Ton
Niesche	X	Habkalk/Kalk
Senke	W	Schlamm/Fäulschlamm
Kerthal	NW	gestörter Boden
Schlenkthal		

Humusform/Humusauflage
(nur wenn ansprechbar)

Wasserstufe

	Mull	cm
	Moder	cm
	Rohhumus	cm

	dürr 5-
	sehr trocken 4-
	trocken 3-
	mäßig trocken
X	frisch 1
	mäßig feucht 2+
	feucht 3+

	wechselfeucht
	halbnass 4+
	wechsellnass
	nass 5+
	offenes Wasser 6+
	quellig
	Qualhwassereinfluss

Schätzskala der Deckung

$r < 1\%$, 1-3 Exemplare	2m = 1-5%, über 50 Exemplare
$+ < 1\%$	3 = 25-50%
1 = 1-5%	4 = 50-75%
2a = 5-12,5%	5 = 75-100%
2b = 12,5-25%	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname: Artmächtigkeit)

K	Achillea millefolium	+
K	Agrimonia eupatoria	r
K	Agrostis capillaris	+
K	Arrhenatherum elatius	1
K	Bromus hordeaceus	3
K	Capsella bursa-pastoris	r
K	Crepis capillaris	+
K	Cynosurus cristatus	+
K	Dactylis glomerata	+
K	Echium vulgare	+
K	Equisetum arvense	+
K	Festuca rubra	+
K	Gallium album	+
K	Holcus lanatus	+
K	Leucanthemum vulgare	r
K	Lolium perenne	+
K	Lotus corniculatus	+
K	Phleum pratense	+
K	Plantago lanceolata	1
K	Potentilla argentea	+
K	Potentilla reptans	+
K	Prunus spinosa	r
K	Rosa canina	r
K	Rumex acetosella	+
K	Senecio jacobaea	+
K	Tragopogon pratensis	+
K	Trifolium arvense	r
K	Trifolium dubium	+
K	Tripelurospermum inodorum	r
K	Veronica chamaedrys	+
K	Vicia angustifolia	+
K	Vicia hirsuta	+

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 04.06.2019

Bearbeiter: Gordon Käbelmann und Andreas Mohr

Nummer: VA 36

$$\frac{\text{Größe in m:}}{5} \times \frac{5}{5} = \frac{25}{5} \text{ m}^2$$

Koordinaten*: 33379019,5925877 / 3m

Biotop: VGR

Blühaspekt:

Carex riparia und Carex acutiformis

Gesamt-Deckung (%) (lebende Phytomasse)	100	Schicht-Höhe
--	-----	--------------

Relief
eben

Hangneigung in Grad bei Exposition

Substrat

Baum-Schicht (%)	-	-	m
Strauch-Schicht (%)	-	-	m
Kraut-Schicht (%)	65	60	cm
Moosee (gesamt) (%)	-	-	cm
Flechten (gesamt) (%)	-	-	-
Streu-Schicht (%)	45	6	cm
Roßboden (%)	0	-	-

X	eben	bei Exposition		Torf, natürlich
	wellig		X	Torf, degradiert
	kuppig			Antorf
	dünig			Sand
	Berg/Rücken			Kies/Steine
	Riedel/Vorsprung			Lehm
	Flachhang < = 9 °			Ton
	Steilhang > = 9 °			Halbkalk/Kalk
	Niesche			Schlamm/Faulsch
	Senke			gestörter Boden
	Kerthal			
	Schallental			

Humusform/Humusaufgabe
(nur wenn ansprechbar)

Wasserstufe

☐ wechselfeucht

Schätzskala der Deckung

Mull	cm
Moder	cm
Rohhumus	cm

	dürr 5-
	sehr trocken 4-
	trocken 3-
	mäßig trocken
	frisch 1
	mäßig feucht 2+
X	feucht 3+

	wechselfeucht
	halbnass 4+
X	wechsellnass
	nass 5+
	offenes Wasser 6+
	quellig
	Qualmwassereinfluss

r = <1%, 1-3 Exemplare	2m = 1-5%, über 50 Exemplare
+ = <1%	3 = 25-50%
1 = 1-5%	4 = 50-75%
2a = 5-12,5%	5 = 75-100%
2b = 12,5-25%	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

Datum: 04.06.2019

Bearbeiter: Gordon Käbelmann und Andreas Mohr

Nummer: VA 37

$$\frac{\text{Größe in m:}}{5} \times \frac{5}{5} = \frac{25}{5} \text{ m}^2$$

Koordinaten*: 33379082,5925714 / 3m

Biotop:	GFF
Blühaspekt:	Symphytum officinale und Rorippa amphibia

Gesamt-Deckung (%)	100	Schicht-Höhe
(lebende Phytomasse)		

Relief
X eben

Hangneigung in Grad bei Exposition

Substrat

Baum-Schicht (%)	-	-	m
Strauch-Schicht (%)	-	-	m
Kraut-Schicht (%)	100	57	cm
Moose (gesamt) (%)			cm
Flechten (gesamt) (%)	-		
Streu-Schicht (%)	-	-	cm
Roßboden (%)	0		

X	eben			Torf, natürlich
	wellig		X	Torf, degradiert
	kuppig			Antorf
	dünn			Sand
	Berg/Rücken			Kies/Steine
	Riedel/Vorsprung			Lehm
	Flachhang < 9 °			Ton
	Steilhang >= 9 °			Haibkalk/Kalk
	Niesche			Schlamm/Faulschlamm
	Senke			gestörter Boden
	Kerthal			
	Schenthal			

Humusform/Humusaufgabe
(nur wenn ansprechbar)

Wasserstufe

wechselfeucht

Schätzskala der Deckung

	Mull	cm
	Moder	cm
	Rohhumus	cm

	dürr 5-
	sehr trocken 4-
	trocken 3-
	mäßig trocken
	frisch 1
	mäßig feucht 2+
X	feucht 3+

	wechselfeucht
	halbnass 4+
X	wechsellnass
	nass 5+
	offenes Wasser 6+
	quellig
	Qualmwassereinfluss

r = <1%, 1-3Exemplare	2m = 1-5%, über 50 Exemplare
+ = <1%	3 = 25-50%
1 = 1-5%	4 = 50-75%
2a = 5-12,5%	5 = 75-100%
2b = 12,5-25%	

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F; Artname; Artmächtigkeit)

[illegible]

Datum: 04.06.2019 Bearbeiter: Gordon Kabelmann und Andreas Mohr Nummer: VA 38

Größe in m: 5 X 5 = 25 m² Koordinaten*: 33378924,5925464 / 3m

Biotoptyp: GFM Blühaspekt: Juncus subnodulosus

Gesamt-Deckung (%) 95 Schicht-Höhe
(lebende Phytomasse)

Baum-Schicht (%) - m
Strauch-Schicht (%) - m
Kraut-Schicht (%) 90 30 cm
Moose (gesamt) (%) 30 cm
Flechten (gesamt) (%) -
Streu-Schicht (%) <1 cm
Rohboden (%) 5

Relief X
eben
wellig
kuppig
düng
Berg/Rücken
Riedel/Vorsprung
Flachhang < = 9 °
Steilhang > = 9 °
Nische
Senke
Kerbtal
Sohlental

Hangneigung in Grad bei Exposition

Substrat
Torf, natürlich
X Torf, degradiert
Antorf
Sand
Kies/Steine
Lehm
Ton
Halbkalk/Kalk
Schlamm/Faulschlamm
gestörter Boden

Humusform/Humusauflage
(nur wenn ansprechbar)

Müll cm
Moder cm
Rohhumus cm

Wasserstufe
dürr 5-
sehr trocken 4-
trocken 3-
mäßig trocken
frisch 1
mäßig feucht 2+
feucht 3+

wechselfeucht
halbnass 4+
wechselfnass
mass 5+
offenes Wasser 6+
quellig
Qualmwassereinfluss

Schätzskala der Deckung
r = <1%, 1-Stkemplare 2m = 1-5%, über 50 Exemplare
+ = <1% 3 = 25-50%
1 = 1-5% 4 = 50-75%
2a = 5-12,5% 5 = 75-100%
2b = 12,5-25%

Artenliste

(Schicht B, S, K, M+F, Artname, Artmächtigkeit)

K	Agrostis stolonifera	1		
K	Alnus glutinosa (juv.)	r		
K	Briza media	+		
K	Calamagrostis stricta	+		
K	Carex disticha	+		
K	Carex lepidocarpa	+		
K	Carex nigra	2b		
K	Carex panicea	+		
K	Cirsium palustre	r		
K	Crepis paludosa	+		
K	Dactylocteniza incarnata	+		
K	Eleocharis unguiculata	2b		
K	Equisetum fluviatile	+		
K	Equisetum palustre	1		
K	Festuca arundinacea	1		
K	Festuca rubra	+		
K	Galium uliginosum	+		
K	Juncus compressus	+		
K	Juncus effusus	+		
K	Juncus subnodulosus	2a		
K	Lotus pedunculatus	+		
K	Lycopus europaeus	+		
K	Lysimachia vulgaris	2a		
K	Mentha aquatica	1		
K	Molinia caerulea	+		
K	Myosotis scorpioides	+		
K	Persicaria amphibia	+		
K	Ranunculus acris	+		
K	Scirpus sylvaticus	+		
K	Succisa pratensis	r		
K	Symphytum officinale	+		
K	Triglochin palustris	r		
K	Valeriana dioica	+		

* Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 33N (ZE-N) (Angaben: Rechtswert, Hochwert, Unschärfe)

9.5 Chronologische Darstellung aller floristischen Artenfunde im NSG Nonnenhof

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden Artenfunde der folgenden Jahre nicht in die folgende Tabelle aufgenommen. Alle nicht in der Tabelle erfassten Funde stammen aus der Quelle LUNG MV (2015, Int.), nur die Angabe von 2017 entstammen der Quelle ZFK MV (2019, Int.).

- 1819: *Asperula cynanchica*
- 1841: *Asperula cynanchica*, *Dianthus superbus*, *Gentiana cruciata*, *Rhynchospora fusca*,
Veronica prostrata ssp. *prostrata*
- 1849: *Gentiana cruciata*
- 1859: *Saxifraga hirculus*
- 1860: *Asperula cynanchica*
- 1901: *Gentiana cruciata*
- 1950: *Malva alcea*
- 1967: *Calamagrostis stricta*
- 1972: *Astragalus arenarius*
- 1974: *Carex praecox* subsp. *praecox*
- 1976: *Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis*
- 1977: *Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis*
- 1978: *Valerianella rimosa*
- 1982: *Epipactis palustris*
- 1983: *Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis*
- 1987: *Catabrosa aquatica*
- 1989: *Circaea x intermedia*, *Potamogeton filiformis*, *Potamogeton praelongus*
- 1992: *Rosa elliptica*
- 1994: *Circaea x intermedia*
- 1996: *Carex praecox* subsp. *praecox*
- 2005: *Apium repens*
- 2009: *Hepatica nobilis*, *Primula veris*
- 2017: *Anemone ranunculoides*, *Corydalis cava*, *Primula veris*

Botanische Namen	Fundjahr							Deutsche Namen
	1986	1988	2000	2007	2008	2014	2019	
<i>Acer negundo</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Eschen-Ahorn
<i>Acer platanoides</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Spitz-Ahorn
<i>Acer pseudoplatanus</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Berg-Ahorn
<i>Achillea millefolium</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Schafgarbe
<i>Acorus calamus</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Kalmus
<i>Aegopodium podagraria</i>	F	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Giersch
<i>Aesculus hippocastanum</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Gew. Rosskastanie
<i>Agrimonia eupatoria</i>	F, L	L	-	-	-	-	Ev	Kleiner Odermennig
<i>Agrostis capillaris</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Rotes Straußgras
<i>Agrostis stolonifera</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Weißes Straußgras
<i>Ajuga genevensis</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Heide-Glünsel
<i>Alliaria petiolata</i>	F	-	-	-	-	G	Eb	Knoblauchsrauke
<i>Allium sativum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Knoblauch
<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Schwarz-Erle
<i>Alopecurus pratensis</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Wiesen-Fuchsschwanz
<i>Anagallis arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Acker-Gauchheil
<i>Anchusa arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Acker-Krummhals
<i>Anchusa officinalis</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Ochsenzunge
<i>Anemone nemorosa</i>	F	-	-	-	-	-	-	Busch-Windröschen
<i>Anemone ranunculoides</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gelbes Windröschen
<i>Angelica sylvestris</i>	F, L	-	-	-	-	G	Ev	Wald-Engelwurz
<i>Anthiscus sylvestris</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Wiesen-Kerbel
<i>Apera spica-venti</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Windhalm
<i>Aphanes arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Ackerfrauenmantel
<i>Arabidopsis thaliana</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Acker-Schmalwand
<i>Arctium lappa</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Große-Klette
<i>Arctium minus</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Kleine Klette
<i>Armeria maritima ssp. elongata</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Grasnélke
<i>Arrhenatherum elatius</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Glatthafer
<i>Artemisia absinthium</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Wermut
<i>Artemisia campestris</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Feld-Beifuß
<i>Artemisia vulgaris</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Beifuß
<i>Astragalus cicer</i>	F, L	-	-	-	-	-	-	Kicher-Tragant
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	F, L	-	-	-	-	-	Eb	Bärenschote
<i>Atriplex prostata</i>	F, L	-	-	-	-	-	-	Spießblättrige Melde
<i>Avena sativa</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Saat-Hafer
<i>Ballota nigra</i>	F, L	-	-	-	-	-	-	Schwarznessel
<i>Bellis perennis</i>	F, L	-	-	-	-	G	Ev	Ausdauerndes Gänseblümchen
<i>Berberoa incana</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Graukresse
<i>Berula erecta</i>	F, L	-	-	-	-	-	Ev	Berle
<i>Betula pendula</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Birke
<i>Betula pubescens</i>	-	-	-	-	-	G	-	Moor-Birke
<i>Bistorta officinalis</i>	F, L	-	L	-	-	-	Eb	Schlangen-Wiesenknöterich
<i>Brachypodium pinnatum</i>	-	L	-	-	-	-	-	Fieder-Zwenke
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	F	-	-	-	-	-	-	Wald-Zwenke
<i>Brassica napus ssp. napus</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Raps
<i>Briza media</i>	-	L	-	-	-	-	Ev	Gew. Zittergras
<i>Bromus hordeaceus</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Weiche Trespe
<i>Bromus inermis</i>	F, L	-	-	-	-	-	Eb	Wehlose Trespe
<i>Bromus sterilis</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Taube Trespe
<i>Calamagrostis canescens</i>	-	-	-	L	-	G	Ev	Sumpf-Reitgras
<i>Calamagrostis epigaejos</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Land-Reitgras
<i>Calamagrostis stricta</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Moor-Reitgras
<i>Caltha palustris</i>	F, L	-	-	-	-	G	Ev	Sumpf-Dotterblume
<i>Calystegia sepium</i>	F, L	-	-	L	-	G	Ev	Gew. Zaunwinde
<i>Campanula patula</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Glockenblume

Botanische Namen	Fundjahr							Deutsche Namen
	1986	1988	2000	2007	2008	2014	2019	
<i>Campanula trachelium</i>	F	-	-	-	-	-	-	Nesselblättrige Glockenblume
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	-	-	-	-	-	-	-	Gew. Hirtentäschel
<i>Cardamine amara</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Bitteres Schaumkraut
<i>Cardamine pratensis</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Wiesen-Schaumkraut
<i>Cardus crispus</i>	-	-	-	-	-	-	-	Krause Distel
<i>Carex acuta</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Schlanke Segge
<i>Carex acutiformis</i>	-	-	-	L	L	G	Ev	Sumpf-Segge
<i>Carex appropinquata</i>	-	-	L	-	-	-	Ev	Schwarzschof-Segge
<i>Carex caryophyllea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Fürlings-Segge
<i>Carex disticha</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Zweizeilige Segge
<i>Carex elata</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Steiße Segge
<i>Carex flacca</i>	-	L	-	-	-	-	Ev	Blaugrüne Segge
<i>Carex hirta</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Behaarte Segge
<i>Carex lepidocarpa</i>	-	-	L	-	-	-	Ev	Schuppenfruchtige Gelb-Segge
<i>Carex nigra</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Segge
<i>Carex otrubae</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Falsche Fuchs-Segge
<i>Carex panicea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Hirse-Segge
<i>Carex paniculata</i>	F, -L	-	-	L	-	-	Ev	Rispfen-Segge
<i>Carex pseudocyperus</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Scheinzypergras-Segge
<i>Carex remota</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Winkel-Segge
<i>Carex riparia</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Ufer-Segge
<i>Carlina vulgaris</i>	-	L	-	-	-	-	-	Gew. Golddistel
<i>Carpinus betulus</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Hainbuche
<i>Centaurea scabiosa</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Skabiosen-Flockenblume
<i>Centaurium erythraea</i>	F, -L	L	-	-	-	-	-	Echtes Tausendgüldenkraut
<i>Cerastium holosteades</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Hornkraut
<i>Cerastium semidecandrum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Sand-Hornkraut
<i>Ceratophyllum demersum</i>	L	-	-	L	L	-	-	Raues Hornblatt
<i>Chaerophyllum temulum</i>	-	-	-	-	-	G	-	Taumei-Kälbekropf
<i>Chelidonium majus</i>	F	-	-	-	-	G	Eb	Schöllkraut
<i>Chenopodium album</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Weißer Gänsefuß
<i>Chenopodium hybridum</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Stechapfelblättriger Gänsefuß
<i>Chenopodium polyspermum</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Vielsamiger Gänsefuß
<i>Chenopodium rubrum</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Roter Gänsefuß
<i>Chondrilla juncea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Großer Knorpellattich
<i>Cichorium intybus</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Wegwarte
<i>Circaea lutetiana</i>	F	-	-	-	-	-	-	Großes Hexenkraut
<i>Cirsium arvense</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Acker-Kratzdistel
<i>Cirsium oleraceum</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Kohl-Kratzdistel
<i>Cirsium palustre</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Sumpf-Kratzdistel
<i>Cirsium vulgare</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Lanzett-Kratzdistel
<i>Convolvulus arvensis</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Acker-Winde
<i>Coryza canadensis</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kanadisches Berufkraut
<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Blutroter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Gew. Hasel
<i>Corynephorus canescens</i>	-	L	-	-	-	-	-	Gew. Silbergras
<i>Crataegus monogyna</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Eingriffeliger Weißdorn
<i>Crepis capillaris</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kleinköpfiger Pippau
<i>Crepis paludosa</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Sumpf-Pippau
<i>Cyanus segetum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kornflockenblume
<i>Cynoglossum officinale</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Echte Hundszunge
<i>Cynosurus cristatus</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Weide-Kammgras
<i>Cyperus fuscus</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Braunes Zypergras
<i>Cytisus scoparius</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Besenginstler
<i>Dactylis glomerata</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Kräueigras
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	-	-	L	-	-	-	Ev	Steifblättrige Fingerwurz

Botanische Namen	Fundjahr							Deutsche Namen
	1986	1988	2000	2007	2008	2014	2019	
<i>Geum urbanum</i>	F	-	-	-	-	G	Ev	Echte Nelkenwurz
<i>Glechoma hederacea</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Gundermann
<i>Glyceria declinata</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Blaugrüner Schwaden
<i>Glyceria fluitans</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Flutender Schwaden
<i>Glyceria maxima</i>	-	-	-	-	-	G	-	Wasser-Schwaden
<i>Grappholum uliginosum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Sumpf-Ruhrkraut
<i>Helichrysium arenarium</i>	-	L	-	-	-	-	Ev	Sand-Strohblume
<i>Helictotrichon pubescens</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Flaumiger Wiesenhafer
<i>Hemerocallis fulva</i>	-	-	-	-	-	G	-	Gelbrote Taglilie
<i>Hieracium murorum</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Wald-Habichtskraut
<i>Hieracium sabaudum</i>	F	-	-	-	-	-	-	Savoyer Habichtskraut
<i>Hieracium spec.</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Habichtskraut
<i>Holcus lanatus</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Wolliges Honiggras
<i>Hordeum vulgare</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Saat-Gerste
<i>Humulus lupulus</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Hopfen
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Europäischer Froschbiss
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Gew. Wassernabel
<i>Hyletephium maximum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Purpur-Waldfeithenne
<i>Hypericum maculatum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kantau-Harthau
<i>Hypericum perforatum</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Tüpfel-Harthau
<i>Hypericum tetrapterum</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Flügel-Harthau
<i>Hypochaeris radicata</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Ferkelkraut
<i>Impatiens glandulifera</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Drüsiges Springkraut
<i>Impatiens noli-tangere</i>	F	-	-	-	-	-	Eb	Großes Springkraut
<i>Impatiens parviflora</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Eb	Kleinblütiges Springkraut
<i>Iris pseudacorus</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Wasser-Schwertlilie
<i>Jasione montana</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Berg-Jasione
<i>Juncus articulatus</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Glieder-Binse
<i>Juncus compressus</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Zusammengedrückte Binse
<i>Juncus effusus</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Flatter-Binse
<i>Juncus inflexus</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Blaugrüne Binse
<i>Juncus subnodulosus</i>	-	-	L	-	-	-	Ev	Stumpfblütige Binse
<i>Knaulia avensis</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Witwenblume
<i>Lamium album</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Weiße Taubnessel
<i>Lamium amplexicaule</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Stängelumfassende Taubnessel
<i>Lamium purpureum</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Rote Taubnessel
<i>Lapsana communis</i>	-	-	-	-	-	G	-	Reinkohl
<i>Lathyrus palustris</i>	-	-	L	-	-	G	-	Sumpf-Platterbse
<i>Lathyrus pratensis</i>	F	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Platterbse
<i>Lathyrus vernus</i>	F	-	-	-	-	-	-	Frühlings-Platterbse
<i>Lemna minor</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Eb	Kleine Wasserlinse
<i>Lemna trisulca</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Eb	Untergetauchte Wasserlinse
<i>Leucanthemum vulgare</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Margerite
<i>Linum catharticum</i>	-	L	-	-	-	-	-	Purgier-Lein
<i>Loium perenne</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Deutsches Weidelgras
<i>Lotus corniculatus agg.</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Hornklee
<i>Lotus pedunculatus</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Sumpf-Hornklee
<i>Luzula campestris</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Feld-Hainsimse
<i>Luzula multiflora</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Vielfblütige Hainsimse
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Kuckucks-Lichtnelke
<i>Lycopus europaeus</i>	F, -L	-	-	L	-	-	Ev	Ufer-Wolfstrapp
<i>Lysimachia nummularia</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Plemnig-Gilbweiderich
<i>Lysimachia vulgaris</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Gilbweiderich
<i>Lytthrum salicaria</i>	F, -L	-	-	L	-	G	Ev	Gew. Blutweiderich

Botanische Namen	Fundjahr							Deutsche Namen
	1986	1988	2000	2007	2008	2014	2019	
<i>Malus domestica</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Kultur-Apple
<i>Malva neglecta</i>	F,-L	-	-	-	-	-	Eb	Weg-Malve
<i>Malva sylvestris</i>	F,-L	-	-	-	-	-	-	Wilde Malve
<i>Matricaria chamomilla</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Echte Kamille
<i>Medicago lupulina</i>	F,-L	-	-	-	-	-	Ev	Hopfenklee
<i>Medicago minima</i>	-	L	-	-	-	-	-	Zwerg-Schneckenklee
<i>Medicago x varia</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Bastard-Luzerne
<i>Melica uniflora</i>	F	-	-	-	-	-	Eb	Einblütiges Perigras
<i>Melilotus officinalis</i>	F,-L	-	-	-	-	-	-	Echter Steinklee
<i>Mentha aquatica</i>	F,-L	-	-	-	-	G	Ev	Wasser-Minze
<i>Menyanthes trifoliata</i>	F,-L	-	L	-	-	-	-	Fieberklee
<i>Milium effusum</i>	F	-	-	-	-	-	-	Wald-Flattergras
<i>Molinia caerulea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Pfeifengras
<i>Myosotis arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Acker- Vergissmännicht
<i>Myosotis scorpioides</i>	F,-L	-	-	-	-	G	Ev	Sumpf- Vergissmännicht
<i>Myosotis stricta</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Sand- Vergissmännicht
<i>Myosotis sylvatica</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Wald- Vergissmännicht
<i>Myriophyllum spicatum</i>	-	-	-	L	L	-	-	Ähren- Tausendblatt
<i>Najas marina</i>	-	-	-	-	L	-	-	Großes Nixkraut
<i>Nasturtium microphyllum</i>	F,-L	-	-	-	-	-	-	Einreihige Brunnenkresse
<i>Nuphar lutea</i>	F,-L	-	-	L	L	-	-	Gelbe Teichrose
<i>Nymphaea alba</i>	-	-	-	L	-	-	-	Weißer Seerosen
<i>Ononis spinosa</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Dornige Hauhechel
<i>Onopordum acanthium</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Eselsdistel
<i>Oxalis acetosella</i>	F	-	-	-	-	G	-	Wald-Sauerklee
<i>Papaver argemone</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Sand-Mohn
<i>Papaver rhoeas</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Klatsch-Mohn
<i>Paris quadrifolia</i>	F	-	-	-	-	-	-	Einbeere
<i>Persicaria amphibia</i> f. terr.	F,-L	-	-	-	-	-	Ev	Wasser-Knöterich
<i>Persicaria lapathifolia</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Amper-Knöterich
<i>Peucedanum palustre</i>	-	-	-	L	-	-	Ev	Sumpf-Haarstrang
<i>Phalaris arundinacea</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Rohr-Glanzgras
<i>Phleum pratense</i>	F,-L	-	-	-	-	G	Ev	Wiesen-Lieschgras
<i>Phragmites australis</i>	-	-	-	L	L	G	Ev	Gew. Schilf
<i>Picris hieracioides</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Bitterkraut
<i>Pilosella officinarum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kleines Mausohrblutschkraut
<i>Pimpinella saxifraga</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kleine Pimpinelle
<i>Plantago arenaria</i>	-	L	-	-	-	-	-	Sand-Wegerich
<i>Plantago lanceolata</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Spitz-Wegerich
<i>Plantago major</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Breit-Wegerich
<i>Platanus x hispanica</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Bastard-Platane
<i>Poa annua</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Einjähriges Rispengras
<i>Poa compressa</i>	-	L	-	-	-	-	Ev	Plattbalm-Rispengras
<i>Poa nemoralis</i>	F	-	-	-	-	-	-	Hain-Rispengras
<i>Poa palustris</i>	-	-	-	-	-	G	-	Sumpf-Rispengras
<i>Poa pratensis</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Wiesen-Rispengras
<i>Poa trivialis</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Rispengras
<i>Polygonum aviculare</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Echter Vogelknöterich
<i>Populus x canadensis</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Kanadische Pappel
<i>Potamogeton lucens</i>	-	-	-	L	-	-	-	Spiegelndes Laichkraut
<i>Potamogeton natans</i>	-	-	-	-	L	-	-	Schwimmendes Laichkraut
<i>Potamogeton pectinatus</i>	-	-	-	L	L	-	-	Kamm-Laichkraut
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	-	-	-	L	L	-	-	Durchwachsenes Laichkraut
<i>Potamogeton pusillus</i>	-	-	-	-	L	-	-	Zwerg-Laichkraut

Botanische Namen	Fundjahr							Deutsche Namen
	1986	1988	2000	2007	2008	2014	2019	
<i>Potentilla anserina</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gänse-Fingerkraut
<i>Potentilla argentea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Silber-Fingerkraut
<i>Potentilla erecta</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Blutwurz
<i>Potentilla reptans</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Kriechendes Fingerkraut
<i>Primula veris</i>	F	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Schlüsselblume
<i>Prunella vulgaris</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Kleine Braunelle
<i>Prunus domestica</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Kultur-Pflaume
<i>Prunus serotina</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Spätblühende Traubenkirsche
<i>Prunus spinosa</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Schlehe
<i>Pulmonaria obscura</i>	F	-	-	-	-	-	Eb	Dunkles Lungenkraut
<i>Pyrus pyraeaster</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Wild-Birne
<i>Quercus robur</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Stiel-Eiche
<i>Quercus rubra</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Rot-Eiche
<i>Ranunculus acris</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Scharfer Hahnenfuß
<i>Ranunculus bulbosus</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Knoilliger Hahnenfuß
<i>Ranunculus circinatus</i>	-	-	-	L	L	-	-	Spreizender Hahnenfuß
<i>Ranunculus flammula</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Brennender Hahnenfuß
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	F	-	-	-	-	-	-	Wolliger Hahnenfuß
<i>Ranunculus lingua</i>	-	-	L	-	-	-	-	Zungen-Hahnenfuß
<i>Ranunculus repens</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Kriechender Hahnenfuß
<i>Ranunculus sceleratus</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Gift-Hahnenfuß
<i>Rhinanthus serotinus</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Großer Klappertopf
<i>Ribes nigrum</i>	-	-	-	-	-	G	-	Schwarze Johannisbeere
<i>Ribes uva-crispa</i>	F	-	-	-	-	G	-	Stachelbeere
<i>Rorippa amphibia</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Wasser-Sumpfkresse
<i>Rorippa palustris</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Gew. Sumpfkresse
<i>Rorippa sylvestris</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Wilde Sumpfkresse
<i>Rosa canina</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Hunds-Rose
<i>Rubus spec.</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Brombeere
<i>Rumex acetosa</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen Sauerampfer
<i>Rumex acetosella</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kleiner Sauerampfer
<i>Rumex crispus</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Krauser Ampfer
<i>Rumex hydrolapathum</i>	-	-	-	-	-	G	-	Fluss-Ampfer
<i>Rumex obtusifolius</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Eb	Stumpblättriger Ampfer
<i>Rumex palustris</i>	-	-	-	-	-	G	-	Sumpf-Ampfer
<i>Salix alba</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Silber-Weide
<i>Salix cinerea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Grau-Weide
<i>Salix fragilis</i>	-	-	-	L	-	G	-	Bruch-Weide
<i>Salix pentandra</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Eb	Lorbeer-Weide
<i>Salix repens</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kriech-Weide
<i>Salix viminalis</i>	-	-	-	-	-	G	-	Korb-Weide
<i>Sambucus nigra</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Schwarzer Holunder
<i>Sanguisorba minor</i>	-	L	-	-	-	-	-	Kleiner Wiesenknopf
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	-	-	-	L	-	-	-	Gew. Teichsinse
<i>Scirpus sylvaticus</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Wald-Sinse
<i>Scorzonoides autumnalis</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Herbst-Schnuppenlöwenzahn
<i>Scrophularia nodosa</i>	F	-	-	-	-	G	-	Knoten-Braunwurz
<i>Scrophularia umbrosa</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Flügel-Braunwurz
<i>Scutellaria galericulata</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Helmkraut
<i>Sedum acre</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Scharfer Mauerpfeffer
<i>Senecio jacobaea</i>	L	-	-	-	-	-	Ev	Jakobs-Greiskraut
<i>Senecio vulgaris</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Gew. Greiskraut
<i>Silene dioica</i>	F	-	-	-	-	-	-	Rote Lichtnelke
<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Weiße Lichtnelke
<i>Solanum dulcamara</i>	F, -L	-	-	L	-	G	-	Bittersüßer Nachschatten
<i>Solidago virgaurea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Goldrute

Botanische Namen	Fundjahr							Deutsche-Namen
	1986	1988	2000	2007	2008	2014	2019	
<i>Sorbus aucuparia</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Eberesche
<i>Sparganium erectum</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Ästiger Igelkolben
<i>Spargula arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Acker-Spergel
<i>Stachys palustris</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Sumpf-Ziest
<i>Stachys sylvatica</i>	F	-	-	-	-	G	Eb	Wald-Ziest
<i>Stellaria aquatica</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Wasserdarm
<i>Stellaria graminea</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gras-Sternmiere
<i>Stellaria media</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Vogelsternmiere
<i>Stellaria nemorum</i>	-	-	-	-	-	G	-	Hain-Sternmiere
<i>Stellaria palustris</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Graugrüne Sternmiere
<i>Stratotes aloides</i>	F, -L	-	-	L	-	-	-	Krebsschere
<i>Succisa pratensis</i>	-	-	L	-	-	-	Ev	Gew. Teufelsabbiss
<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Gew. Schneebeere
<i>Symphytum officinale</i>	F, -L	-	-	-	-	G	Ev	Gew. Beinwell
<i>Syringa vulgaris</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Gew. Flieder
<i>Tanacetum vulgare</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Rainfarn
<i>Taraxacum Sect. Ruderalia</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Wiesen-L Löwenzahn-Gruppe
<i>Thelypteris palustris</i>	L	-	-	L	-	-	Ev	Sumpffarn
<i>Thlaspi arvense</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Acker-Hellerkraut
<i>Tilia platyphyllos</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Sommer-Linde
<i>Tragopogon pratensis</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Bocksbart
<i>Trifolium alpestre</i>	F	-	-	-	-	-	-	Hügel-Klee
<i>Trifolium arvense</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Hasen-Klee
<i>Trifolium dubium</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Kleiner Klee
<i>Trifolium hybridum</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Schweden-Klee
<i>Trifolium medium</i>	F	-	-	-	-	-	-	Zickzack-Klee
<i>Trifolium pratense</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Wiesen-Klee
<i>Trifolium repens</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Weiß-Klee
<i>Triglochin palustris</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Sumpf-Dreizack
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Geruchlose Kamille
<i>Triticum aestivum</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Saat-Weizen
<i>Typha latifolia</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Breitblättriger Rohrkolben
<i>Ulmus glabra</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Berg-Ulme
<i>Ulmus laevis</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Flatter-Ulme
<i>Urtica dioica</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Große Brennnessel
<i>Urticularia vulgaris</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Gew. Wasserschlauch
<i>Valeriana dioica</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Kleiner Baldrian
<i>Valeriana officinalis</i>	F	-	-	-	-	-	Ev	Echter Arznei-Baldrian
<i>Valerianella locusta</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gew. Rapunzchen
<i>Verbascum nigrum</i>	L	-	-	-	-	-	-	Schwarze Königskerze
<i>Verbascum thapsus</i>	-	-	-	-	-	G	Ev	Kleinblütige Königskerze
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	F, -L	-	-	-	-	G	-	Blauer Wasser-Ehrenpreis
<i>Veronica arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Feld-Ehrenpreis
<i>Veronica beccabunga</i>	F, -L	-	-	-	-	-	Ev	Bach-Ehrenpreis
<i>Veronica catenata</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Roter Wasser-Ehrenpreis
<i>Veronica chamaedrys</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Gamander-Ehrenpreis
<i>Veronica scutellata</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Schild-Ehrenpreis
<i>Veronica serpyllifolia</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Quendel-Ehrenpreis
<i>Viburnum opulus</i>	F	-	-	-	-	G	-	Gew. Schneeball
<i>Vicia angustifolia</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Saat-Wicke
<i>Vicia cracca</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Vogel-Wicke
<i>Vicia hirsuta</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Behaarte Wicke
<i>Vicia sativa</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Saat-Wicke
<i>Vicia sepium</i>	F, -L	-	-	-	-	-	-	Zaun-Wicke
<i>Vicia tetrasperma</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Viersamige Wicke
<i>Vicia villosa</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Zottel-Wicke

Botanische Namen	Fundjahr							Deutsche Namen
	1986	1988	2000	2007	2008	2014	2019	
<i>Viola arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	Ev	Acker-Stiefmütterchen
<i>Viola riviniana</i>	F	-	-	-	-	-	-	Hain-Veilchen
<i>Viola tricolor</i>	-	-	-	-	-	-	Eb	Wildes Stiefmütterchen
<i>Viscum album</i>	-	-	-	-	-	G	Eb	Gew. Mistel
Summe:	140	14	9	23	11	108	302	

Eb = eigener Beifund (nicht mit VA belegt)
 Ev = eigener Fund (in VA)
 F = Quelle: Flora MV
 L = Quelle: LUNG MV
 G = Quelle: BUND NB - Geo Tag der Artenvielfalt

Eidesstattliche Erklärung

Ich, Gordon Käbelmann, erkläre hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Masterarbeit mit dem Thema „Vegetationsveränderungen im Naturschutzgebiet „Nonnenhof“ (MV)“ selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Ort, Datum

Unterschrift